

Espaces vectoriels

Exercice 1 Dans les cas suivants, déterminer si l'ensemble E muni de la loi interne \oplus et de la loi externe $*$ est un espace vectoriel sur \mathbb{R} :

- $E = (\mathbb{R}_+^*, \oplus, *)$ avec $\forall u \in \mathbb{R}_+^*, \forall v \in \mathbb{R}_+^*, \forall \alpha \in \mathbb{R}, \begin{cases} u \oplus v = uv \\ \alpha * u = u^\alpha \end{cases}$
- $E = (\mathbb{R}^2, \oplus, *)$ avec $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \forall (x', y') \in \mathbb{R}^2, \forall \alpha \in \mathbb{R}, \begin{cases} (x, y) \oplus (x', y') = (x + x', y + y') \\ \alpha * (x, y) = (\alpha x, 0) \end{cases}$

Exercice 2 Déterminer si les ensembles ci-dessous sont des sous-espaces vectoriels du \mathbb{R} -espace vectoriel $(E, +, \cdot)$.

- $E = \mathbb{R}^2$:
 $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 3x - 2y = 0\}$ $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 3x - 2y = 1\}$
 $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy \geq 0\}$ $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = x^2\}$
- $E = \mathbb{R}^3$:
 $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x + y = 0 \text{ et } z = -3x\}$
 $B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$
- $E = \mathbb{R}_4[X]$:
 A : ensemble des polynômes de degré 2 $B = \{P \in E : P(0) = 2\}$
 $C = \{P \in E : 2P' - P = 0\}$ $D = \{P \in \mathbb{R}[X] : P(7) = P'(-5)\}$
- $E = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ (ensemble des suites réelles) :
 A : ensemble des suites croissantes B : ensemble des suites monotones
 C : ensemble des suites bornées D : ensemble des suites de limite ℓ (fixée)
 E : ensemble des suites arithmétiques F : ensemble des suites géométriques
- $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ (ensemble des fonctions de \mathbb{R} dans \mathbb{R}) :
 A : ensemble des fonctions 2π -périodiques $B = \{f \in E : \forall x \in \mathbb{R}, |f(x)| \leq 3\}$
 $C = \{f \in E : f(1) + f(-1) = 1\}$ $D = \{f \in \mathcal{F} : \forall x \in \mathbb{R}, f(2x) = f(x)\}$
 $E = \{f \in E : \forall x \in \mathbb{R}, f'(x) + xf(x) = 0\}$ $F = \{f \in E : \int_2^5 f(x) dx = 0\}$

Exercice 3 Dans le \mathbb{R} -espace vectoriel $E = \mathbb{R}^3$, on considère les sous-ensembles suivants :

$$F_1 = \{(2\lambda, 3\lambda, 5\lambda), \lambda \in \mathbb{R}\}, \quad F_2 = \{(x, y, z) \in E : x + 6y - z = 0\},$$

$$F_3 = \{(x, y, z) \in E : (x + 2y = 0) \text{ et } (3x + 2y + z = 0)\}.$$

- Montrer que F_1, F_2 et F_3 sont des sous-espaces vectoriels de E .
- Déterminer les sous-espaces vectoriels $F_i \cap F_j$ pour $i \neq j, i, j \in \{1, 2, 3\}$.

Exercice 4 Dans le \mathbb{R} -espace vectoriel $E = \mathbb{R}^3$ rapporté à sa base canonique $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ($\vec{i} = (1, 0, 0), \vec{j} = (0, 1, 0), \vec{k} = (0, 0, 1)$), on considère les vecteurs

$$\vec{u}_1 = \vec{i} - \vec{j} + \vec{k}, \quad \vec{u}_2 = \vec{i} + 2\vec{j} + 4\vec{k}, \quad \vec{u}_3 = 3\vec{i} - \vec{j} + a\vec{k}, \quad \vec{u}_4 = 2\vec{i} + 3\vec{j} + b\vec{k}.$$

Déterminer les réels a et b de telle sorte que les familles de vecteurs (\vec{u}_1, \vec{u}_2) et (\vec{u}_3, \vec{u}_4) engendrent le même sous-espace vectoriel de E . On pourra introduire les sous-espaces vectoriels $F = \text{vect}(\vec{u}_1, \vec{u}_2)$ et $G = \text{vect}(\vec{u}_3, \vec{u}_4)$.

Exercice 5 Dans le \mathbb{R} -espace vectoriel $E = \mathbb{R}^4$, les familles de vecteurs suivantes sont-elles libres ? génératrices de E ? des bases de E ?

- $\mathcal{E} = ((1, -1, 3, 4), (0, 1, -1, 2), (0, 3, -2, 1))$;
- $\mathcal{F} = ((1, 1, 1, 1), (1, 1, 1, -1), (1, 1, -1, 1), (1, -1, 1, 1), (-1, 1, 1, 1))$;
- $\mathcal{G} = ((1, 1, 1, a), (3, 4, 2, b), (2, 4, 1, c), (5, 6, 5, d))$, a, b, c, d étant des paramètres réels.

Exercice 6 Dans l'espace vectoriel donné, les familles suivantes sont-elles libres ou liées ?

- Dans le \mathbb{R} -ev \mathbb{R}^2 : $\mathcal{E} = ((-4, 2), (2, 1))$.
- Dans le \mathbb{R} -ev \mathbb{R}^3 : $\mathcal{F} = ((-1, 1, 2), (2, 0, 1), (6, 2, 0))$.
- Dans le \mathbb{C} -ev \mathbb{C}^3 : $\mathcal{G} = ((1, 1 + i, 0), (2i, 0, -i), (3 - 4i, 3 + 3i, 2i))$.
- Dans le \mathbb{R} -ev $\mathbb{R}[X]$: $\mathcal{H} = (1, X(X - 1), X^2(X + 1), X(X - 1)^2)$.

Exercice 7 Déterminer le rang des familles de vecteurs suivantes :

- $\mathcal{E} = ((2, -1, 3), (-1, 0, 1), (7, 5, 4), (-2, 6, 8))$;
- $\mathcal{F} = ((1, 1, \alpha), (1, \alpha, 1), (\alpha, 1, 1))$ (faire une discussion suivant les valeurs de $\alpha \in \mathbb{R}$) ;
- $\mathcal{G} = ((1, 1, 0, 0), (0, 1, 1, 0), (0, 0, 1, 1), (1, 0, 0, 1))$;
- $\mathcal{H} = ((1, 0, 2, 3), (7, 4, -2, 1), (5, 2, 4, 7), (3, 2, 0, 1), (0, 0, 1, 1))$.

Exercice 8 Dans le \mathbb{R} -espace vectoriel $E = \mathbb{R}^4$, on considère les sous-ensembles suivants :

$$F_1 = \{(\lambda + \mu, -\lambda, \lambda + 2\mu, \mu + \nu), \lambda, \mu, \nu \in \mathbb{R}\},$$

$$F_2 = \{(x, y, z, t) \in E : (3x + 4y + z + 2t = 0) \text{ et } (6x + 8y + 2z + 5t = 0) \text{ et } (9x + 12y + 3z + 10t = 0)\}.$$

- Montrer que F_1 et F_2 sont des sous-espaces vectoriels de E dont on déterminera pour chacun une base \mathcal{B}_1 et \mathcal{B}_2 ainsi que sa dimension.
- Déterminer le sous-espace vectoriel $F_1 \cap F_2$.
- Déterminer deux vecteurs \vec{u}, \vec{v} de F_1 tel que $(\vec{u}, \vec{v}) \cup \mathcal{B}_2$ soit une base de E . Déterminer de même un vecteur \vec{w} de F_2 tel que $(\vec{w}) \cup \mathcal{B}_1$ soit une base de E .

Exercice 9 Soit $E = \mathbb{R}_4[X]$ et soit \mathcal{B} sa base canonique. Soit $\mathcal{C} = ((X - 2)^k)_{0 \leq k \leq 4}$.

- Rappeler la formule de Taylor pour les fonctions polynômes de degré n .
- Justifier que \mathcal{C} est une base de E .
- Soit $P = X^4 - X^3 - 2X^2 + 5$. Donner les coordonnées de P dans la base \mathcal{B} , puis dans la base \mathcal{C} .

Exercice 10 Dans $\mathbb{R}[X]$, soit $\mathcal{F} = (P, Q)$ avec $P = 3X^3 - 2X + 1$ et $Q = X^3 - 4$. Soit $\mathcal{G} = (R, S, T)$ avec $R = 5X^3 - 2X - 7$, $S = X^3 - 2X + 9$, et $T = 2X - 13$.

- Les familles \mathcal{F} et \mathcal{G} sont-elles libres ? Quels sont leurs rangs respectifs ?
- Montrer que $\text{Vect}(\mathcal{F}) = \text{Vect}(\mathcal{G})$.

Exercice 11 On se place dans le \mathbb{R} -espace vectoriel E des fonctions de \mathbb{R} dans \mathbb{R} et l'on considère le sous-ensemble F des fonctions $f_{a,\varphi} \in E$ où a et φ sont des paramètres réels définies par $\forall x \in \mathbb{R}, f_{a,\varphi}(x) = a \cos(x - \varphi)$.

1. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de E ; on pourra écrire $f_{a,\varphi}$ sous une autre forme.
2. Déterminer une base de F et préciser sa dimension.

Exercice 12 Soit $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et les deux vecteurs de $E : f : x \mapsto e^x$ et $g : x \mapsto e^{-x}$. On pose $H = \text{Vect}(f, g)$.

1. Soit $\mathcal{B} = (f, g)$. Justifier que \mathcal{B} est une base de H et en déduire $\dim(H)$.
2. Montrer que les fonctions ch et sh sont éléments de H et donner leurs coordonnées dans la base \mathcal{B} . La famille (ch, sh) est-elle une base de H ?

Pour les insatiables...

Exercice 13 Dans le \mathbb{R} -espace vectoriel $E = \mathbb{R}^3$ rapporté à sa base canonique $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère la famille de vecteurs $\mathcal{B}' = (\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}, \vec{j} + 2\vec{k}, 2\vec{j} + \vec{k})$.

1. Montrer que \mathcal{B}' est une base de E .
2. Déterminer l'ensemble F des vecteurs de E qui ont mêmes coordonnées dans les bases \mathcal{B} et \mathcal{B}' .
3. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de E .

Exercice 14 Soit $E = \mathbb{C}^2$.

1. Définir sur E la structure d'espace vectoriel « canonique » sur \mathbb{C} .
2. Déterminer une base du \mathbb{C} -espace vectoriel E .
3. Le sous-ensemble $\{(z_1, z_2) \in E : z_1 + z_2 \in \mathbb{R}\}$ est-il un sous-espace vectoriel de E ? Dans l'affirmative, en déterminer une base.
4. La famille de vecteurs $((1, 0), (1, i), (1, 2))$ est-elle libre? génératrice de E ?
5. Reprendre les questions précédentes en prenant \mathbb{R} au lieu de \mathbb{C} pour corps de scalaires.

Exercice 15 L'ensemble $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ des matrices réelles 2×2 de la forme $\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$ auquel on adjoint la somme de matrices et la multiplication externe naturelle a une structure d'espace vectoriel isomorphe à celle de \mathbb{R}^4 . Déterminer une base et la dimension de l'ensemble des matrices :

1. triangulaires supérieures;
2. diagonales ($b = c = 0$);
3. des homothéties de \mathbb{R}^2 ;
4. à trace nulle ($a + d = 0$).

Reprendre l'exercice avec l'ensemble $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ des matrices réelles $n \times n$ pour un entier $n \geq 2$. La structure naturelle d'espace vectoriel est dans ce cas isomorphe à celle de \mathbb{R}^{n^2} .

Exercice 16 Pour tout $a > 0$, on note f_a la fonction définie sur \mathbb{R}_*^+ par $f_a(x) = \ln(ax)$. Montrer que (f_1, f_2, f_3) est une famille liée de $\mathcal{F}(\mathbb{R}_*^+, \mathbb{R})$.

Exercice 17 Pour tout $x \in [-1, 1]$, on note $\arccos(x)$ (resp. $\arcsin(x)$) l'unique angle appartenant à $[0, \pi]$ (resp. $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$) dont le cosinus (resp. sinus) vaut x . On définit ainsi deux applications arccos et arcsin de $\mathcal{F}([-1, 1], \mathbb{R})$.

1. Montrer que $\forall x \in [-1, 1], \arccos(x) + \arcsin(x) = \frac{\pi}{2}$.
2. En déduire que $(\arccos, \arcsin, \mathbf{1})$ est une famille liée de $\mathcal{F}([-1, 1], \mathbb{R})$.

Exercice 18 On note $(\mathcal{F}, +, \cdot)$ le \mathbb{R} -espace vectoriel des fonctions de \mathbb{R} dans \mathbb{R} et \mathcal{D}^2 le sous-espace vectoriel de \mathcal{F} des fonctions deux fois dérivables.

On considère $E = \{f \in \mathcal{D}^2 : f'' + f = 0\}$ et $F = \{f \in \mathcal{F} : \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = f(-x)\}$.

1. Montrer que E est un espace vectoriel de dimension finie. Donner une base de E et préciser la dimension de E .
2. Montrer que F est un espace vectoriel.
3. Justifier que $E \cap F$ est un espace vectoriel de dimension finie. Déterminer sa dimension.

Exercice 19 Soit E un \mathbb{R} -espace vectoriel et F, G deux sous-espaces vectoriels de E . On pose $F + G = \{\vec{u} + \vec{v}, (\vec{u}, \vec{v}) \in F \times G\}$.

1. Dans cette question seulement : soit $E = \mathbb{R}^3, F = \text{Vect}((1, 0, 0)), G_1 = \text{Vect}((0, 1, 0))$ et $G_2 = \text{Vect}((0, 1, 0); (0, 0, 1))$.
Quels sont les vecteurs de $F + G_1$ et de $F + G_2$? Décrire géométriquement $F + G_1$.
2. Montrer que $F + G$ est un sous-espace vectoriel de E contenant $F \cup G$.
3. Montrer que $F + G$ est le plus petit sous-espace vectoriel de E contenant $F \cup G$. On montrera que si H est un sous-espace vectoriel de E contenant $F \cup G$, alors H contient nécessairement $F + G$.
On dit que $F + G$ est le sous-espace vectoriel de E engendré par $F \cup G$, c'est-à-dire $F + G = \text{vect}(F \cup G)$, et que c'est la somme des deux sous-espaces vectoriels F et G .
4. Soit $\mathcal{F} = (\vec{f}_1, \dots, \vec{f}_p)$ une base de F et $\mathcal{G} = (\vec{g}_1, \dots, \vec{g}_q)$ une base de G . On pose $\mathcal{H} = (\vec{f}_1, \dots, \vec{f}_p, \vec{g}_1, \dots, \vec{g}_q)$.

- (a) Justifier le fait que \mathcal{H} est une famille génératrice de $F + G$.
- (b) Montrer que \mathcal{H} est une famille libre si et seulement si $F \cap G = \{\vec{0}_E\}$.
 - Lorsque $F \cap G = \{\vec{0}_E\}$, on dit que F et G sont en somme directe et on note leur somme $F \oplus G$. Dans ce cas, la famille \mathcal{H} est une base de $F \oplus G$. De plus, on a $\dim(F \oplus G) = \dim(F) + \dim(G)$.
 - Lorsque $F \oplus G = E$, on dit que F et G sont supplémentaires dans E .
- (c) Montrer que dans l'exemple de la question 1, F et G_1 sont en somme directe, et F et G_2 sont supplémentaires dans E .

Exercice 20 Soit E un \mathbb{R} -espace vectoriel et F, G deux sous-espaces vectoriels de E . On pose $F + G = \{\vec{u} + \vec{v}, (\vec{u}, \vec{v}) \in F \times G\} = \text{vect}(F \cup G)$ (voir exercice 19). On admet la formule suivante (*formule de Grassmann*) : lorsque F et G sont de dimensions finies,

$$\dim(F + G) = \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G).$$

- Soit F et G deux sous-espaces vectoriels de dimension 2 de \mathbb{R}^3 . Répondre par VRAI ou FAUX, justifier, commenter.
 - On peut en déduire que $F = G$
 - On a $2 \leq \dim(F + G) \leq 4$
 - On a $1 \leq \dim(F \cap G) \leq 2$
- Soit F et G deux sous-espaces vectoriels de \mathbb{R}^4 , $\dim(F) = 3$ et $\dim(G) = 2$. Compléter :
 - $\dots \leq \dim(F + G) \leq \dots$ et $\dots \leq \dim(F \cap G) \leq \dots$
 - Si $\dim(F \cap G) = 2$ alors $F + G = \dots$ et $F \cap G = \dots$
- Soit F et G deux sous-espaces vectoriels de dimension 3 de \mathbb{R}^4 . Compléter :
 - $\dots \leq \dim(F + G) \leq \dots$ et $\dots \leq \dim(F \cap G) \leq \dots$
 - Si F et G sont distincts, alors $F + G = \dots$ et $F \cap G = \dots$

Exercice 21 On se place dans le \mathbb{R} -espace vectoriel E des applications de \mathbb{R} dans \mathbb{R} .

- Montrer que si λ et μ sont deux réels, alors les familles suivantes sont libres :
 - $\{x \mapsto e^{\lambda x}, x \mapsto e^{\mu x}\}$ (avec $\lambda \neq \mu$) ;
 - $\{x \mapsto e^{\lambda x}, x \mapsto xe^{\lambda x}\}$;
 - $\{x \mapsto e^{\lambda x} \cos(\mu x), x \mapsto e^{\lambda x} \sin(\mu x)\}$ (avec $\mu \neq 0$).
- Soit $a, b \in \mathbb{R}$ et F l'ensemble des solutions de l'équation différentielle dans E $y'' + ay' + by = 0$. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de E .
 - Déterminer une base de F ainsi que sa dimension dans les cas $[a = -3, b = 2]$, $[a = 2, b = 1]$ et $[a = 4, b = 5]$.

Exercice 22 Soit a et b deux réels distincts et $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$. On se place dans le \mathbb{R} -espace vectoriel $E = \mathbb{R}_n[X]$ des polynômes de degré au plus n et l'on pose pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, $F_\lambda = \{P \in E : P(\lambda) = 0\}$.

- Montrer que F_a est un sous-espace vectoriel de E . Déterminer une base \mathcal{B}_a de F_a puis donner sa dimension (on pourra utiliser la formule de Taylor).
- Déterminer un polynôme P_0 de E tel que $(P_0) \cup \mathcal{B}_a$ soit une base de E . On pourra utiliser une division euclidienne par $(X - a)$.
- Décrire le sous-espace vectoriel $F_a \cap F_b$. Déterminer une base de $F_a \cap F_b$ puis donner sa dimension (on pourra utiliser la formule de Taylor).
- À l'aide d'une division euclidienne par $(X - a)(X - b)$ et de l'écriture d'un polynôme de degré au plus 1 comme combinaison linéaire de $(X - a)$ et $(X - b)$, obtenir une décomposition d'un polynôme quelconque de E en la somme d'un polynôme de F_a et d'un polynôme de F_b .

Exercice 23 Soit E l'ensemble de suites réelles $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifiant la relation de récurrence $u_{n+2} + u_n = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- Montrer que E est un \mathbb{R} -espace vectoriel.
- Écrire la forme générale des suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de E en fonction des premiers termes u_0 et u_1 .
- En déduire une base de E .

Exercice 24 Soit E l'ensemble de suites réelles $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifiant la relation de récurrence $u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- Montrer que E est un \mathbb{R} -espace vectoriel.
- Déterminer deux suites géométriques dans E qui forment une famille libre.
- Pour tout couple de réels (a, b) , montrer qu'il existe une unique suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de E vérifiant $u_0 = a$ et $u_1 = b$.
 - On introduit les suites $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de E vérifiant $v_0 = 1, v_1 = 0$ et $w_0 = 0, w_1 = 1$. Montrer que pour toute suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de E , on a $u_n = u_0 v_n + u_1 w_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Donner alors une base de E ainsi que sa dimension.
- En déduire qu'à chaque suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de E , on peut associer un unique couple de réels (λ, μ) tel que l'on ait pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \lambda 2^n + \mu 3^n$.

Exercice 25

- Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est *récurrente linéaire* lorsque ses termes vérifient une relation de type $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = au_n$ pour un $a \in \mathbb{R}$. Dans \mathbb{R}^4 , on dit que (x_0, x_1, x_2, x_3) est une condition initiale valide pour $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ lorsque x_0, x_1, x_2, x_3 sont les quatre premiers termes d'une suite vérifiant la relation $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = au_n$. Montrer que l'ensemble C_a des conditions initiales valides de la relation $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = au_n$ est un sous-espace vectoriel de \mathbb{R}^4 . En déterminer une base.
- Faire de même, avec l'ensemble $C_{a,b}$ des conditions initiales valides de la récurrence double $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$ pour des $a, b \in \mathbb{R}$.
- Faire de même pour une récurrence triple.

Exercice 26

- On considère un sous-espace vectoriel F de d'un espace vectoriel E qui est distinct de E et de $\{\vec{0}_E\}$. On note \bar{F} le complémentaire de F dans E , c'est-à-dire l'ensemble des vecteurs de E qui ne sont pas dans F . On définit $\Omega_F = \bar{F} \cup \{\vec{0}_E\}$.
- Ω_F est-il stable par multiplication externe ?
- Ω_F est-il un sous-espace vectoriel de E ?
- Montrer que $\text{vect}(\Omega_F) = E$, c'est-à-dire que le plus petit sous-espace vectoriel de E contenant Ω_F est E lui-même.