

FICHE TD 1 - FONCTIONS DE PLUSIEURES VARIABLES

Exercice 1 (Changement de coordonnées)

1. Exprimer en coordonnées polaires le point du plan donné en coordonnées cartésiennes par $P = (\sqrt{3}, 1)$.
2. Exprimer en coordonnées cylindriques et sphériques le point de l'espace donné en coordonnées cartésiennes par $Q = (1, 1, 1)$.

Exercice 2 (Topologie des ensembles)

Considérons les sous-ensembles suivants de \mathbb{R}^2 :

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; y \geq x^2, y \leq x + 1\},$$

$$B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; y \geq x^2\},$$

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; y > x^2\},$$

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; y > x^2, y < x + 1\}.$$

Pour chacun d'entre eux, dire s'il est ouvert, fermé, borné et compact. Justifier la réponse.

Exercice 3 (Domaine et image)

Trouver le domaine et l'image des fonctions suivantes :

$$f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad g(x, y) = \frac{e^{x+y}}{x-y}, \quad h(x, y) = \ln(x+y).$$

Exercice 4 (Lignes de niveau)

Soit f une fonction de deux variables, de domaine $\mathcal{D}_f \subset \mathbb{R}^2$. On rappelle que, pour tout $k \in \mathbb{R}$, l'ensemble $L_k = \{(x, y) \in \mathcal{D}_f; \text{tel que } f(x, y) = k\}$ s'appelle *ligne de niveau* k de la fonction f .

1. Trouver les lignes de niveaux 0, 1, -1, 2 et 3 de la fonction $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ et les représenter graphiquement dans le domaine carré : $x \in [-1, 1]$ et $y \in [-1, 1]$.

Même question avec $g(x, y) = x^2 + y^2$ et $h(x, y) = \frac{2y}{x}$ ($x \neq 0$).

2. Pour la fonction $f(x, y) = x - y - |x - y|$, tracer les lignes de niveau pour $k \in \mathbb{R}$. Traiter séparément les cas $k = 0$, $k > 0$ et $k < 0$.

Exercice 5 (Fonctions partielles)

Soit f une fonction de $D \subset \mathbb{R}^2$ dans \mathbb{R} et (a, b) un point intérieur de D . On rappelle que les fonctions à une variable

$$x \mapsto f(x, b) \quad \text{et} \quad y \mapsto f(a, y)$$

définies sur un intervalle ouvert contenant respectivement a et b , s'appellent *fonctions partielles* associées à f au point (a, b) . Trouver les fonctions partielles aux points $(0, 0)$ et $(1, 2)$ de

$$f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad g(x, y) = xy, \quad h(x, y) = x^2y - 1.$$

Exercice 6 (Graphe)

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x, y) = x^2 + 4y^2$. Dessiner dans \mathbb{R}^2 les lignes de niveau L_k pour $k \in \{0, 1, 4, 9\}$. Représenter graphiquement la surface $z = x^2 + 4y^2$.

Exercice 7 (Composées)

Considérons les trois fonctions

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2},$$

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(t) = t^4 + 1,$$

$$h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad h(\rho, \theta) = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta).$$

Quelles sont les possibles composées ? Les calculer.