
Feuille de TD 6

Exercice 1

Soient H un espace de Hilbert et $u \in B(H)$. Montrer l'équivalence entre

- u est une isométrie, c'est à dire $\|u(x)\|_2 = \|x\|_2$ pour tout $x \in H$.
- Pour tout $x, y \in H$, $\langle u(x), u(y) \rangle = \langle x, y \rangle$
- $u^*u = Id$

(Indication : penser à l'identité de polarisation).

Exercice 2

Soient H un espace de Hilbert et $v \in B(H)$. Montrer l'équivalence entre

- Pour tout $x \in \text{Ker}(v)^\perp$, on a $\|v(x)\|_2 = \|x\|_2$
- $v^*vv^* = v^*$
- $vv^*v = v$
- Pour tout $x \in \text{Ker}(v^*)^\perp$, on $\|v^*(x)\|_2 = \|x\|_2$

On dit que v est une isométrie partielle si a) est vérifié. Nous avons donc montré que l'adjoint d'une isométrie partielle est une isométrie partielle.

Exercice 3 Soit H un espace de Hilbert séparable. Montrer que tout ensemble orthonormal E est au plus dénombrable. (Indication : si G est dénombrable dense, construire une injection de E dans G en considérant des boules de rayon $\frac{1}{2}$.)

Exercice 4 Soit H un espace de Hilbert.

- Soit $x, y \in H$ avec $\text{Re}\langle x, y \rangle = \|x\|^2 = \|y\|^2$. Montrer que $x = y$.

Soient (x_n) et (y_n) deux suites de H vérifiant $\|x_n\| \leq 1$ et $\|y_n\| \leq 1$.

- On suppose que $\langle x_n, y_n \rangle \rightarrow 1$ quand $n \rightarrow \infty$. Montrer que $x_n - y_n \rightarrow 0$.
- On suppose que $\|x_n + y_n\| \rightarrow 2$ quand $n \rightarrow \infty$. Montrer que $x_n - y_n \rightarrow 0$.

Exercice 5 Soient H un espace de Hilbert séparable, (e_n) une base hilbertienne et (f_n) une suite orthonormale. On suppose que

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} \|e_n - f_n\|^2 < \infty.$$

Le but de l'exercice est de démontrer que (f_n) est aussi une base hilbertienne.

- Soient $g \in H$, $N \in \mathbb{N}$ et $f_n \perp g$ pour tout $n \geq N$. Montrer l'inégalité

$$\left\| \sum_{n \geq N} \langle e_n, g \rangle e_n \right\|^2 \leq \|g\|^2 \sum_{n \geq N} \|e_n - f_n\|^2.$$

On choisit maintenant un $N \in \mathbb{N}$ tel que

$$\sum_{n \geq N} \|e_n - f_n\|^2 < 1.$$

- Montrer que tout vecteur g orthogonal à e_0, e_1, \dots, e_{N-1} et f_N, f_{N+1}, \dots est nul.

c) On considère les vecteurs

$$\eta_n = e_n - \sum_{k \geq N} \langle f_k, e_n \rangle f_k, \quad n < N.$$

Montrer que tout vecteur g orthogonal à $\eta_0, \eta_1, \dots, \eta_{N-1}$ et f_N, f_{N+1}, \dots est nul.

d) Soit S l'orthogonal de l'espace engendré par les vecteurs f_N, f_{N+1}, \dots . Montrer que $\eta_n \in S$ pour tout $n < N$ et que $\dim S \leq N$.

e) Montrer enfin que (f_n) est une base hilbertienne.

Exercice 6 On note par X l'espace vectoriel complexe engendré par les fonctions de la forme $\mathbb{R} \ni t \mapsto e^{iwt} \in \mathbb{C}$ où w parcourt \mathbb{R} . Pour $f, g \in X$ on pose

$$\langle f, g \rangle = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T f(t) \overline{g(t)} dt.$$

a) Montrer que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ définit un produit scalaire sur X .

b) Vérifier que la famille $(e^{iwt})_{w \in \mathbb{R}}$ est orthonormale.

c) X est-il un espace de Hilbert ?

Exercice 7 Soient E et F deux sous-espaces fermés orthogonaux d'un espace de Hilbert. Montrer que $E + F$ est fermé.

Exercice 8 Soient E et F deux sous-espaces fermés d'un espace de Hilbert. Montrer les égalités suivantes :

$$(E + F)^\perp = E^\perp \cap F^\perp, \quad (E \cap F)^\perp = \overline{E^\perp + F^\perp}.$$

Exercice 9 Soient $H = L^2(0, 1)$ et

$$V = \{f \in H ; \int_0^1 f = \int_0^{\frac{1}{2}} f = 0\}.$$

a) Montrer que V est fermé dans H . Déterminer une base de V^\perp .

b) Soit $f(x) = x$. Calculer la projection orthogonale de f sur V , puis $d(f, V)$.

Exercice 10 Soit H un espace de Hilbert $T : H \rightarrow H$ linéaire et continue. Déterminer l'adjoint T^* dans les cas suivants :

a) T est la projection orthogonale sur un sous-espace fermé V .

b) $H = \mathbb{C}^n$ ou \mathbb{R}^n et T est de matrice A dans une base orthonormée.

c) $H = L^2(X, \mu)$ et $Tf = hf$ avec h bornée donnée.

d) $H = L^2(X, \mu)$ et $Tf(x) = \int_X K(x, y)f(y) d\mu(y)$ où $K \in L^2(X \times X, \mu \otimes \mu)$ s'appelle le noyau intégral de T .