

# Calcul Différentiel et Analyse Complexe

## Épreuve terminale, 22 mai 2019

Durée : 3h ; calculettes interdites ; seule une feuille A4 (recto-verso) de notes est autorisée ; composer chaque exercice sur une feuille distincte. Les questions ne sont pas forcément en ordre de difficulté ; le barème étant sur 27, il n'est pas obligatoire de tout traiter.

**Exercice 1** (6 points). Étant donnés des réels  $\alpha, \beta > 0$ , considérer la fonction  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ , définie par

$$f(x, y) = (x^2 - y^2, 2|x|^\alpha |y|^\beta).$$

1. Prouver que  $f$  est une fonction  $C^1$  sur  $\mathbb{R}^2$  si et seulement si  $\alpha, \beta > 1$ .
2. Prouver que  $f$  est différentiable en  $(0, 0)$  si et seulement si  $\alpha + \beta > 1$ .
3. Prouver que  $f$  est une fonction  $C^2$  sur  $\mathbb{R}^2$  si et seulement si  $\alpha, \beta \geq 2$ .
4. En identifiant  $\mathbb{R}^2$  à  $\mathbb{C}$ , pour quelles valeurs de  $\alpha$  et  $\beta$  la fonction  $f$  est-elle holomorphe sur  $(\mathbb{R}_+)^2$  ?
5. Prouver que  $f$  n'est jamais holomorphe sur  $\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_-$ .

**Exercice 2** (5 points). Considérer l'ensemble  $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : f(x, y) = 1\}$ , où  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  est définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 + y^2 \frac{x^2 + y^2}{3x^2 + 2y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}.$$

1. Prouver que  $A$  est localement paramétrisable par une courbe régulière.
2. Faire un dessin schématique de l'ensemble  $A$ .
3. En considérant  $A$  comme un lacet dans  $\mathbb{C}$ , calculer l'indice du point  $2i$  par rapport à  $A$ .

**Exercice 3** (8 points). Soit  $m \geq 1$  un entier impaire, et  $a \geq 0$  un réel. On considère  $I_{m,a} = \int_a^\infty \frac{\sin(x)}{x^m} dx$ .

1. Justifier d'abord la convergence de l'intégrale impropre pour  $a \geq 0, m = 1$ , et pour  $a > 0, m > 1$ .
2. On considère le cas  $m = 1, a = 0$ . Établir que l'on a

$$2iI_{1,0} = \lim_{r \rightarrow +\infty} \int_{\{r^{-1} \leq |x| \leq r\}} \frac{e^{ix}}{x} dx.$$

3. Dessiner le contour  $\gamma = [-r, -r^{-1}] \cup \{r^{-1}e^{i\theta}, \pi \leq \theta \leq 2\pi\} \cup [r^{-1}, r] \cup \{re^{i\theta}, 0 \leq \theta \leq \pi\}$  parcouru dans le sens direct.
4. Calculer  $\int_\gamma \frac{e^{iz}}{z} dz$  par la formule des résidus.
5. Montrer en utilisant  $|e^{i(x+iy)}| \leq e^{-y}$  que l'intégrale  $\int_{\{re^{i\theta}, \theta \in [0, \pi]\}} \frac{e^{iz}}{z} dz$  tend vers 0 quand  $r \rightarrow +\infty$ .
6. Montrer que l'on a  $\int_{\{r^{-1}e^{i\theta}, \theta \in [\pi, 2\pi]\}} \frac{e^{iz}}{z} dz \rightarrow i\pi$  quand  $r \rightarrow +\infty$ .
7. Conclure en obtenant la valeur de  $I_{1,0}$ .
8. (*Question plus difficile*) En suivant des étapes similaires et en considérant le contour  $\gamma = [-r, -a] \cup \{ae^{i\theta}, \pi \leq \theta \leq 2\pi\} \cup [a, r] \cup \{re^{i\theta}, 0 \leq \theta \leq \pi\}$ , prouver que l'on a, pour  $m = 2k + 1$  :

$$I_{m,a} = \frac{\pi(-1)^k}{2(2k)!} - \sum_{j: k+j \geq 0} \frac{(-1)^{k+j} a^{2j+1}}{(2j+1)(2k+2j+1)!}.$$

**Exercice 4** (8 points). Soit  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un ouvert et  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$  une fonction holomorphe qui vérifie l'implication suivante  $f(z) \in \mathbb{R} \Rightarrow f(z) > 0$ .

1. Prouver qu'il existe une fonction holomorphe  $g$  telle que  $f = e^g$  et qu'on peut choisir  $g$  telle que  $|\operatorname{Im}(g)| < \pi$ .
2. Prouver que  $e^{ig}$  est une fonction holomorphe bornée. En déduire, si  $\Omega = \mathbb{C}$ , que  $f$  est constante.
3. Prouver que, pour tout lacet  $\gamma$  contenu dans  $\Omega$ , on a  $\int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)} dz = 0$ .
4. Supposons  $\Omega = B(0, 1) \setminus \{0\}$ . Prouver que 0 est soit une singularité artificielle de  $f$ , soit une singularité essentielle, mais pas un pôle.
5. Dans le cas d'une singularité artificielle, on appelle  $\tilde{f}$  l'extension holomorphe de  $f$  à  $B(0, 1)$  : prouver  $\tilde{f}(0) \neq 0$ .
6. Peut-on avoir  $\tilde{f}(0) \in \mathbb{R}$  avec  $\tilde{f}(0) < 0$  ?
7. Supposons  $\Omega = \mathbb{C} \setminus \overline{B(0, 1)}$  et  $|f(z)| \leq C|z|^m$ . Démontrer que  $f$  est bornée.
8. Peut-on dire que  $f$  est constante, alors ? (pour répondre "non" il faut trouver un exemple de fonction  $f$  non-constante définie sur cet ouvert  $\Omega$  et satisfaisant la condition  $f(z) \in \mathbb{R} \Rightarrow f(z) > 0$ ).

# Calcul Différentiel et Analyse Complexe

## Épreuve terminale, 22 mai 2019

Durée : 3h ; calculettes interdites ; seule une feuille A4 (recto-verso) de notes est autorisée ; composer chaque exercice sur une feuille distincte. Les questions ne sont pas forcément en ordre de difficulté ; le barème étant sur 27, il n'est pas obligatoire de tout traiter.

**Exercice 1** (6 points). Étant donnés des réels  $\alpha, \beta > 0$ , considérer la fonction  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ , définie par

$$f(x, y) = (x^2 - y^2, 2|x|^\alpha |y|^\beta).$$

1. Prouver que  $f$  est une fonction  $C^1$  sur  $\mathbb{R}^2$  si et seulement si  $\alpha, \beta > 1$ .
2. Prouver que  $f$  est différentiable en  $(0, 0)$  si et seulement si  $\alpha + \beta > 1$ .
3. Prouver que  $f$  est une fonction  $C^2$  sur  $\mathbb{R}^2$  si et seulement si  $\alpha, \beta \geq 2$ .
4. En identifiant  $\mathbb{R}^2$  à  $\mathbb{C}$ , pour quelles valeurs de  $\alpha$  et  $\beta$  la fonction  $f$  est-elle holomorphe sur  $(\mathbb{R}_+)^2$  ?
5. Prouver que  $f$  n'est jamais holomorphe sur  $\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_-$ .

### Solution

1. Si  $\alpha, \beta > 1$  les fonctions  $x \mapsto |x|^\alpha$  et  $y \mapsto |y|^\beta$  sont  $C^1$ , d'où  $f$  est  $C^1$ . Si un des deux exposant n'est pas plus grand que 1, alors la fonction  $f$  n'est pas différentiable sur certains points d'un axe. Par exemple, dans le cas  $\alpha \leq 1$ , on peut regarder  $f(x, 1)$ , dont la deuxième composante vaut  $2|x|^\alpha$ , qui n'est pas différentiable en  $x = 0$ .
2. On a  $f(0, 0) = 0$ . Si  $\alpha + \beta > 1$  on a  $f(x, y) = o(\|(x, y)\|)$ , ce qui implique que  $f$  est différentiable en  $(0, 0)$  avec différentielle nulle. Si  $\alpha + \beta \leq 1$ , on peut regarder  $f(x, x)$ , dont la deuxième composante vaut  $2|x|^{\alpha+\beta}$  et n'est pas différentiable en  $x = 0$ .
3. Si  $\alpha, \beta \geq 2$  les fonctions  $x \mapsto |x|^\alpha$  et  $y \mapsto |y|^\beta$  sont  $C^2$ , d'où  $f$  est  $C^2$ . Si un des deux exposant n'est pas au moins deux, alors la fonction  $f$  n'est pas  $C^2$  si restreinte à des droites opportunes. Par exemple, dans le cas  $\alpha < 2$ , on peut regarder  $f(x, 1)$ , dont la deuxième composante vaut  $2|x|^\alpha$ , qui n'est pas une fonction  $C^2$  au voisinage de 0.
4. Pour  $\alpha = \beta = 1$  la fonction  $f$  coïncide, sur  $(\mathbb{R}_+)^2$ , avec  $f(z) = z^2$  et elle est donc holomorphe. Ceci ne peut pas être vrai pour d'autres valeurs de  $\alpha, \beta$ , sinon on aurait deux fonctions holomorphes (celle pour  $\alpha = \beta = 1$  et l'autre) dont la partie réelle coïncide. Par différence, une fonction holomorphe avec partie réelle nulle. Ceci implique que cette fonction serait constante et, comme ces fonctions sont aussi continues sur tout  $\mathbb{R}^2$  et nulles en  $(0, 0)$ , la différence serait nulle.
5. Comme dans la question précédente, si on avait  $f(x, y) = (x^2 - y^2, 2xy)$  alors  $f$  serait holomorphe. Ici on a changé de signe à la partie imaginaire, donc  $f$  est la conjuguée complexe d'une fonction holomorphe non-constante et n'est donc pas holomorphe.

**Exercice 2** (5 points). Considérer l'ensemble  $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : f(x, y) = 1\}$ , où  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  est définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 + y^2 \frac{x^2 + y^2}{3x^2 + 2y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}.$$

1. Prouver que  $A$  est localement paramétrisable par une courbe régulière.
2. Faire un dessin schématique de l'ensemble  $A$ .
3. En considérant  $A$  comme un lacet dans  $\mathbb{C}$ , calculer l'indice du point  $2i$  par rapport à  $A$ .

### Solution

1.  $f$  est  $C^1$  (au moins en dehors de l'origine, mais en fait même en l'origine) et on a, pour  $(x, y) \neq 0$


$$\nabla f(x, y) = \left( 2x - \frac{2xy^4}{(3x^2 + 2y^2)^2}, y - \frac{3x^4 y}{(3x^2 + 2y^2)^2} \right).$$

L'origine (où ce calcul ne marche pas) n'appartient sûrement pas à  $A$ . On regarde en quels points de  $A$  on a  $\nabla f = 0$ . On voit que  $x = 0$  et  $\nabla f(x, y) = 0$  implique  $y = 0$ , et de même  $y = 0$  et  $\nabla f(x, y) = 0$  implique  $x = 0$ . Comme on exclut l'origine, on peut supposer alors  $x \neq 0$  et  $y \neq 0$ . Le système  $\nabla f(x, y) = 0$  devient donc

$$\begin{cases} (3x^2 + 2y^2)^2 = 3x^4 \\ (3x^2 + 2y^2)^2 = y^4. \end{cases}$$

Or, ce système n'a pas de solutions avec  $x, y \neq 0$  car  $(3x^2 + 2y^2)^2 > 9x^4 > 3x^4$ . Donc le gradient de  $f$  ne s'annule pas sur  $A$  et le théorème des fonctions implicites nous garantit que  $A$  est localement le graphe d'une fonction régulière et donc paramétrable par une courbe régulière.

2. Voici un dessin cordonnées polaires. A noter qu'on peut écrire  $A$  de la manière suivante :  $r^2 = (2 + \cos^2(\theta))/(1 + \cos^2(\theta) + \cos^4(\theta))$ .



3. Le point  $2i$  correspond à  $(0, 2)$  dans  $\mathbb{R}^2$ . On a  $f(0, y) = y^2/2$ , donc  $f(0, 2) > 1$  et  $f(0, y) > 1$  pour tout  $y > \sqrt{2}$ . Donc  $2i$  est dans la composante connexe non bornée du complémentaire de  $A$ . Son indice est donc 0.

**Exercice 3** (8 points). Soit  $m \geq 1$  un entier impaire, et  $a \geq 0$  un réel. On considère  $I_{m,a} = \int_a^\infty \frac{\sin(x)}{x^m} dx$ .

1. Justifier d'abord la convergence de l'intégrale impropre pour  $a \geq 0, m = 1$ , et pour  $a > 0, m > 1$ .
2. On considère le cas  $m = 1, a = 0$ . Établir que l'on a


$$2iI_{1,0} = \lim_{r \rightarrow +\infty} \int_{\{r^{-1} \leq |x| \leq r\}} \frac{e^{ix}}{x} dx.$$

3. Dessiner le contour  $\gamma = [-r, -r^{-1}] \cup \{r^{-1}e^{i\theta}, \pi \leq \theta \leq 2\pi\} \cup [r^{-1}, r] \cup \{re^{i\theta}, 0 \leq \theta \leq \pi\}$  parcouru dans le sens direct.
4. Calculer  $\int_\gamma \frac{e^{iz}}{z} dz$  par la formule des résidus.
5. Montrer en utilisant  $|e^{i(x+iy)}| \leq e^{-y}$  que l'intégrale  $\int_{\{re^{i\theta}, \theta \in [0, \pi]\}} \frac{e^{iz}}{z} dz$  tend vers 0 quand  $r \rightarrow +\infty$ .
6. Montrer que l'on a  $\int_{\{r^{-1}e^{i\theta}, \theta \in [\pi, 2\pi]\}} \frac{e^{iz}}{z} dz \rightarrow i\pi$  quand  $r \rightarrow +\infty$ .
7. Conclure en obtenant la valeur de  $I_{1,0}$ .
8. (*Question plus difficile*) En suivant des étapes similaires et en considérant le contour  $\gamma = [-r, -a] \cup \{ae^{i\theta}, \pi \leq \theta \leq 2\pi\} \cup [a, r] \cup \{re^{i\theta}, 0 \leq \theta \leq \pi\}$ , prouver que l'on a, pour  $m = 2k + 1$  :

$$I_{m,a} = \frac{\pi(-1)^k}{2(2k)!} - \sum_{j:k+j \geq 0} \frac{(-1)^{k+j} a^{2j+1}}{(2j+1)(2k+2j+1)!}.$$

### Solution

1. Pour  $m > 1$  l'intégrale converge en l'infini, mais diverge en 0 parce que  $\sin(x)/x^m \approx x^{1-m}$ , d'où la restriction  $a > 0$ . Pour  $m = 1$  il n'y a pas de divergence en 0, mais la fonction n'est pas intégrable en valeur absolue en l'infini. Pourtant,  $\int_1^M \sin(x)/x dx = \int_1^M \cos(x)/x^2 dx + [\sin(x)/x]_{x=1}^{x=M}$  par IPP, ce qui montre que la limite pour  $M \rightarrow \infty$  de l'intégrale existe et est finie (la première intégrale étant convergente, le terme de bord en  $M$  tendant vers 0).
2. On a  $I_{1,0} = \int_0^\infty \frac{\sin(x)}{x} dx = \int_0^\infty \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2ix} dx$ . Il suffit de voir que  $\int_0^\infty \frac{-e^{-ix}}{x} dx = \int_{-\infty}^0 \frac{e^{ix}}{x} dx$  et ensuite écrire ces intégrales comme une limite en 0 et en  $\infty$ .
3. Voilà



4. En écrivant  $e^{iz} = \sum_{n \in \mathbb{Q}^0} i^n z^n / n!$ , on voit que le résidu de  $e^{iz}/z$  en  $z = 0$  est 1, donc  $\int_\gamma \frac{e^{iz}}{z} dz = 2\pi i$ .
5. On a  $\int_{\{re^{i\theta}, \theta \in [0, \pi]\}} \frac{e^{iz}}{z} dz = \int_0^\pi e^{ir \cos(\theta) - r \sin \theta} i d\theta$ , donc l'intégrale qu'on doit estimer est bornée par  $\int_0^\pi e^{-r \sin \theta} d\theta$ . La fonction intégrande tend simplement vers 0 p.p. et est dominée par la constante 1, son intégrale tend alors vers 0. Pour justifier la même chose sans utiliser la convergence dominée, il suffit de fixer  $\varepsilon > 0$  et voir que l'intégrande converge uniformément vers 0 sur  $[\varepsilon, \pi - \varepsilon]$  et qu'elle est plus petite que 1 partout. La limsup de cette intégrale est donc plus petite que  $2\varepsilon$ , pour  $\varepsilon$  arbitraire.
6. On écrit  $e^{iz} = 1 + zh(z)$ , avec  $h$  holomorphe bornée au voisinage de 0. On a donc

$$\int_{\{r^{-1}e^{i\theta}, \theta \in [\pi, 2\pi]\}} \frac{e^{iz}}{z} dz = \int_{\{r^{-1}e^{i\theta}, \theta \in [\pi, 2\pi]\}} \left( \frac{1}{z} + h(z) \right) dz.$$

On a  $|\int_{\{r^{-1}e^{i\theta}, \theta \in [\pi, 2\pi]\}} h(z) dz| \leq (\sup_{B(0,1)} |h|) \pi r^{-1} \rightarrow 0$ , et l'intégrale de  $1/z$  se calcule explicitement puisque

$$\int_{\{r^{-1}e^{i\theta}, \theta \in [\pi, 2\pi]\}} \frac{1}{z} dz = \int_\pi^{2\pi} r e^{-i\theta} i r^{-1} e^{i\theta} d\theta = i\pi.$$

7. On déduit donc que  $2iI_{1,0} + 0 + \pi i = 2\pi i$ , d'où  $I_{1,0} = \pi/2$ .

8. Les étapes à suivre sont les mêmes mais

- Le résidu de  $z^{-m} \sum_{n \neq 0} i^n z^n / n!$  s'obtient en prenant  $n = m - 1$ , et il vaut donc  $i^{m-1} / (m-1)!$ .
- Il est plus facile de voir maintenant que  $\int_{\{re^{i\theta}, \theta \in [0, \pi]\}} \frac{e^{iz}}{z^m} dz$  tend vers 0, parce qu'on l'estime avec  $r^{1-m} \int_0^\pi e^{-r \sin \theta} d\theta$ .
- On ne peut pas faire un calcul asymptotique pour l'intégrale  $\int_{\{ae^{i\theta}, \theta \in [\pi, 2\pi]\}} \frac{e^{iz}}{z^m} dz$  puisque  $a$  est maintenant fixé. En utilisant la convergence uniforme de la série de l'exponentielle on a

$$\int_{\{ae^{i\theta}, \theta \in [\pi, 2\pi]\}} \frac{e^{iz}}{z^m} dz = \sum_{n \geq 0} \int_\pi^{2\pi} \frac{i^n a^n e^{in\theta}}{a^m e^{im\theta}} i a e^{i\theta} d\theta = \sum_{n \geq 0} \frac{i^{n+1} a^{n+1-m}}{n!} \int_\pi^{2\pi} e^{i(n+1-m)\theta} d\theta.$$

Pour calculer les intégrales dans la série, on distingue deux cas,  $n = m - 1$ , où l'intégrande est constante. Pour cette valeur de  $n$  on a  $\int_\pi^{2\pi} e^{i(n+1-m)\theta} d\theta = \pi$ . Pour les autres valeurs de  $n$ , on a

$$\int_\pi^{2\pi} e^{i(n+1-m)\theta} d\theta = \frac{1}{i(n+1-m)} \left[ e^{i(n+1-m)\theta} \right]_{\theta=\pi}^{\theta=2\pi}.$$

On voit que le terme de bord s'annule si  $n + 1 - m$  est paire, donc on considère juste le cas  $n = m + 2j$ ,  $j \in \mathbb{Z}$ . Dans ce cas on a  $\int_\pi^{2\pi} e^{i(n+1-m)\theta} d\theta = \frac{2}{i(n+1-m)}$ . On obtient alors

$$2iI_{m,a} + 0 + \pi \frac{i^m}{(m-1)!} + \sum_{n \geq 0, n=m+2j} \frac{2i^{n+1} a^{n+1-m}}{i(n+1-m)n!} = \frac{2\pi i^m}{(m-1)!}.$$

Réarrangeant cette expression et posant  $m = 2k + 1$  on obtient ce que l'on cherche.

**Exercice 4** (8 points). Soit  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un ouvert et  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$  une fonction holomorphe qui vérifie l'implication suivante  $f(z) \in \mathbb{R} \Rightarrow f(z) > 0$ .

1. Prouver qu'il existe une fonction holomorphe  $g$  telle que  $f = e^g$  et qu'on peut choisir  $g$  telle que  $|\operatorname{Im}(g)| < \pi$ .
2. Prouver que  $e^{ig}$  est une fonction holomorphe bornée. En déduire, si  $\Omega = \mathbb{C}$ , que  $f$  est constante.
3. Prouver que, pour tout lacet  $\gamma$  contenu dans  $\Omega$ , on a  $\int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)} dz = 0$ .
4. Supposons  $\Omega = B(0, 1) \setminus \{0\}$ . Prouver que 0 est soit une singularité artificielle de  $f$ , soit une singularité essentielle, mais pas un pôle.
5. Dans le cas d'une singularité artificielle, on appelle  $\tilde{f}$  l'extension holomorphe de  $f$  à  $B(0, 1)$  : prouver  $\tilde{f}(0) \neq 0$ .
6. Peut-on avoir  $\tilde{f}(0) \in \mathbb{R}$  avec  $\tilde{f}(0) < 0$ ?
7. Supposons  $\Omega = \mathbb{C} \setminus \overline{B(0, 1)}$  et  $|f(z)| \leq C|z|^m$ . Démontrer que  $f$  est bornée.
8. Peut-on dire que  $f$  est constante, alors? (pour répondre "non" il faut trouver un exemple de fonction  $f$  non-constante définie sur cet ouvert  $\Omega$  et satisfaisant la condition  $f(z) \in \mathbb{R} \Rightarrow f(z) > 0$ ).

### Solution

1. On prend la détermination principale du logarithme d'un nombre complexe  $\log z := \log |z| + i \arg(z)$  (où  $\arg(z)$  est l'argument de  $z$ , c'est-à-dire l'angle que  $z$  fait avec l'axe réel positif, pris dans  $] -\pi, \pi[$ ). C'est une fonction bien définie sur  $\mathbb{C}$  privé de la demi-droite négative. C'est une fonction holomorphe par inversion de l'exponentielle. On peut prendre donc  $g = \log(f)$ .

2. En utilisant  $|e^{iz}| = e^{\operatorname{Re}(iz)} = e^{-\operatorname{Im}(z)}$  on trouve  $|e^{ig}| \leq e^\pi$ . La fonction  $e^{ig}$  est alors holomorphe bornée sur  $\mathbb{C}$ , donc constante (Liouville). On en déduit que  $g$  et  $f$  sont constantes aussi. Pour déduire que  $g$  est constante il y a deux possibilités : soit on dérive  $e^{ig}$ , ce qui donne  $ig'e^{ig}$  et montre  $g' = 0$ , soit on note qu'on devrait avoir  $g = c + 2k\pi$  pour  $k \in \mathbb{Z}$  et, par continuité de  $g$  et connexion de  $\mathbb{C}$ , on a  $k = \text{const}$ .
3.  $f = e^g$  implique  $f' = e^g g' = fg'$ , donc  $g' = f'/f$ . La fonction  $f'/f$  admet donc une primitive, et ses intégrales sur les lacets sont nulles. Attention, le seul fait que  $f'/f$  est holomorphe (ce qui est vrai, puisque  $f \neq 0$ ) ne suffit pas : le théorème qui dit que l'intégrale de toute fonction holomorphe sur un lacet est nulle demande comme hypothèse que l'intérieur du lacet soit inclus dans  $\Omega$ , ce qui n'est pas forcément le cas ici. Autre erreur commune : on n'est plus en train de supposer  $\Omega = \mathbb{C}$ , donc vous ne pouvez pas supposer  $f$  constante.
4. Supposons que 0 soit un pôle. Alors on a  $f(z) = z^{-m}h(z)$ , avec  $h$  holomorphe telle que  $h(0) \neq 0$ . On trouve  $f'/f = h'/h - m/z$  et le résidu de  $f'/f$  en 0 est donc  $-m$ . Alors on aurait, prenant pour  $\gamma$  un cercle autour de l'origine parcouru en sens direct,  $\int_\gamma f'(z)/f(z)dz = -2\pi im$ . Pourtant cette intégrale s'annule, donc on trouve  $m = 0$ , ce qui signifie que  $f$  n'aurait pas de pôle en 0.
5. Si  $\tilde{f}(0) = 0$  on aurait  $f(z) = z^m h(z)$  pour  $m > 0$ . Le même calcul d'intégrale donne une contradiction.
6. Si  $\tilde{f}(0)$  est dans la demi-droite négative, cela signifie qu'un point de type  $t < 0$  est dans l'image de  $\tilde{f}$ . Or, cette image est ouverte (sauf si  $\tilde{f}$  est constante, ce qui impliquerait  $f = t < 0$ , ce qui est absurde), donc d'autres points de ce type seraient dans l'image de  $\tilde{f}$ . Puisque l'image de  $\tilde{f}$  est celle de  $f$  avec en plus  $\tilde{f}(0)$ , on trouverait de points de la demi-droite négative dans l'image de  $f$ , ce qui est une contradiction.
7. Prenons  $g(z) = f(1/z)$ . La fonction  $g$  serait holomorphe sur  $B(0,1) \setminus \{0\}$ , avec  $|g(z)| \leq C|z|^{-m}$ . Donc on a  $g(z) = z^{-m}h(z)$  avec  $h$  holomorphe bornée. Quitte à changer  $m$ , on peut supposer que  $h$  ne s'annule pas, mais, sauf pour  $m = 0$ , on trouverait un pôle en 0, ce qui est une contradiction. Alors  $m = 0$  et  $g$ , et donc  $f$ , est bornée.
8. On ne peut pas invoquer le théorème de Liouville, parce que  $\Omega \neq \mathbb{C}$ . Il est peut-être possible que  $f$  ne soit pas forcément constante, alors, mais il faut trouver un exemple. Le voilà :  $f(z) = 1/z + 2$ . Cette fonction prend des valeurs dans  $B(2,1)$ , qui est disjoint de la demi-droite négative.