

Corrigé de l'examen du 16 décembre 2025

DURÉE : 1 h 30

Questions de cours.

Soit $\|\cdot\|$ une norme sur $\mathbf{R}^2$.

Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbf{R})$ ayant une valeur propre réelle double λ et telle que $A \neq \lambda I_2$.

On note (H) $y'(t) = Ay(t)$, $t \in \mathbf{R}$.

1. Montrer qu'il existe une base (v_1, v_2) de $\mathbf{R}^2$ telle que $Av_1 = \lambda v_1$ et $Av_2 = v_1 + \lambda v_2$.

Voir le cours.

2. Pour $k = 1, 2$, on définit $\varphi_k: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}^2$, $t \mapsto e^{tA}v_k$. Montrer que (φ_1, φ_2) est un système fondamental de solutions de (H), et que pour tout $t \in \mathbf{R}$, $\varphi_1(t) = e^{\lambda t}v_1$ et $\varphi_2(t) = te^{\lambda t}v_1 + e^{\lambda t}v_2$.

Voir le cours.

3. (Cette question n'est pas exactement une question de cours).

On suppose de plus que $\lambda < 0$. Soit $y: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}^2$ une solution de (H).

Montrer qu'il existe $K \geq 0$ et $\alpha > 0$ tels que pour tout $t \in \mathbf{R}_+$, $\|y(t)\| \leq Ke^{-\alpha t}$.

Par la question précédente, il existe $a, b \in \mathbf{R}$ tels que $y = a\varphi_1 + b\varphi_2$.

Soit $t \in \mathbf{R}_+$. On a

$$\begin{aligned} \|y(t)\| &= \left\| ae^{\lambda t}v_1 + b \left(te^{\lambda t}v_1 + e^{\lambda t}v_2 \right) \right\| \\ &\leq |a|e^{\lambda t}\|v_1\| + |b|te^{\lambda t}\|v_1\| + |b|e^{\lambda t}\|v_2\| \end{aligned}$$

Soit $\alpha \in]0, -\lambda[$. Alors $\alpha + \lambda < 0$ donc par croissances comparées, $se^{(\alpha+\lambda)s} \xrightarrow{s \rightarrow +\infty} 0$. De plus, la fonction $s \mapsto se^{(\alpha+\lambda)s}$ est continue, elle est donc bornée sur $\mathbf{R}_+$: il existe $C \geq 0$ tel que pour tout $s \in \mathbf{R}_+$, $se^{(\alpha+\lambda)s} \leq C$, ou encore $se^{\lambda s} \leq Ce^{-\alpha s}$.

De plus, $\lambda < -\alpha$ donc $e^{\lambda t} \leq e^{-\alpha t}$, donc

$$\begin{aligned} \|y(t)\| &\leq |a|e^{-\alpha t}\|v_1\| + |b|Ce^{-\alpha t}\|v_1\| + |b|e^{-\alpha t}\|v_2\| \\ &\leq Ke^{-\alpha t} \end{aligned}$$

avec $K = (|a| + |b|C)\|v_1\| + |b|\|v_2\|$.

Exercice 1.

On considère l'équation différentielle

$$\begin{cases} x'(t) = y(t), \\ y'(t) = (x(t)^3 - x(t)) \exp(-x(t)^2) - y(t), \end{cases} \quad t \in \mathbf{R}. \quad (1)$$

1. Déterminer les points d'équilibre du système (1).

Le champ de vecteurs (autonome) associé à (1) est $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $(x, y) \mapsto (y, (x^3 - x)e^{-x^2} - y)$,

Soit $(x^*, y^*) \in \mathbf{R}^2$,

$$(x^*, y^*) \text{ équilibre pour (1)} \iff \begin{cases} y^* = 0 \\ ((x^*)^3 - x^*)e^{-(x^*)^2} - y^* = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} y^* = 0 \\ (x^*)^3 - x^* = 0 \end{cases} \\ \iff \begin{cases} y^* = 0 \\ x^* = 0 \text{ ou } x^* = 1 \text{ ou } x^* = -1 \end{cases}$$

Le système (1) admet donc trois points d'équilibres : $(x^*, y^*) = (0, 0)$, $(x^*, y^*) = (1, 0)$ et $(x^*, y^*) = (-1, 0)$.

2. Étudier leur stabilité au moyen du théorème de Lyapounov.

f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbf{R}^2$. On calcule la jacobienne de f en tout point $(x, y) \in \mathbf{R}^2$:

$$Jf(x, y) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ e^{-x^2}(-2x(x^3 - x) + 3x^2 - 1) & -1 \end{pmatrix}$$

On a

- $A_1 = Jf(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$: le polynôme caractéristique de A_1 est $X^2 + X + 1$, donc A_1 a pour valeurs propres $\frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$ et $\frac{-1-i\sqrt{3}}{2}$, de parties réelles strictement négatives ; le théorème de Lyapounov assure que l'équilibre $(0, 0)$ est asymptotiquement stable ;
- $A_2 = Jf(1, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{2}{e} & -1 \end{pmatrix}$: le déterminant de A_2 vaut $-\frac{2}{e} < 0$, donc A_2 a deux valeurs propres réelles de signes opposés ; l'une d'elle est donc strictement positive et le théorème de Lyapounov assure que l'équilibre $(1, 0)$ est instable ;
- $A_3 = Jf(-1, 0) = A_2$: on conclut de même que l'équilibre $(-1, 0)$ est instable.

3. Soit $(x_0, y_0) \in \mathbf{R}^2$. Montrer que l'équation différentielle (1) admet une unique solution maximale $(x, y) : J \rightarrow \mathbf{R}^2$ telle que $(x(0), y(0)) = (x_0, y_0)$, définie sur un intervalle ouvert J .

On note $J =]\tau, T[$, avec $\tau < 0 < T$ finis ou non.

Le champ de vecteurs f associé à (1) est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbf{R}^2$ donc par le théorème de Cauchy-Lipschitz, le système (1) admet une unique solution maximale $(x, y) : J \rightarrow \mathbf{R}^2$ vérifiant $(x(0), y(0)) = (x_0, y_0)$, et cette solution est définie sur un intervalle ouvert J contenant 0.

4. On définit $\psi : J \rightarrow \mathbf{R}$ par : pour tout $t \in J$, $\psi(t) = \frac{1}{2}y(t)^2 + \frac{1}{2}x(t)^2e^{-x(t)^2}$.

Montrer que ψ est décroissante.

Comme x et y sont dérivables, ψ est dérivable sur J par composition, et

$$\begin{aligned} \psi' &= yy' + e^{-x^2}(xx' - x^2xx') = yy' - e^{-x^2}(x^3 - x)x' \\ &= y((x^3 - x)e^{-x^2} - y) - e^{-x^2}(x^3 - x)y \\ &= -y^2 \leq 0 \end{aligned}$$

donc ψ est décroissante sur J .

5. En déduire que y est bornée sur $[0, T[$.

Soit $t \in [0, T[$. Comme $x(t)^2e^{-x(t)^2} \geq 0$, on a $y(t)^2 \leq 2\psi(t) \leq 2\psi(0)$, donc $|y(t)| \leq \sqrt{2\psi(0)}$.

Ainsi, y est bornée sur $[0, T[$.

6. On suppose que $T < +\infty$. Montrer que x est bornée sur $[0, T[$.

Soit $t \in [0, T[$. Alors, $|x'(t)| = |y(t)| \leq \sqrt{2\psi(0)}$. De plus, x est de classe $\mathcal{C}^1$ donc

$$x(t) = x(0) + \int_0^t x'(s)ds$$

d'où

$$|x(t)| \leq |x_0| + \sqrt{2\psi(0)} t \leq |x_0| + \sqrt{2\psi(0)} T$$

ainsi x est bornée sur $[0, T[$.

7. Montrer que $T = +\infty$.

Supposons $T < +\infty$. Par le théorème d'explosion en temps fini, $\|(x(t), y(t))\|_1 \xrightarrow[t \rightarrow T^-]{} +\infty$.

Or pour tout $t \in [0, T[$,

$$\|(x(t), y(t))\|_1 = |x(t)| + |y(t)| \leq |x_0| + \sqrt{2\psi(0)} (T + 1)$$

ce qui est contradictoire. Ainsi, $T = +\infty$.

Exercice 2.

Soit $\theta: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ une fonction continue telle que $\int_0^{+\infty} |\theta(t)| dt < \infty$.

On considère l'équation différentielle suivante :

$$y''(t) + 3y'(t) + (2 + \theta(t))y(t) = 0, \quad t \in \mathbf{R}. \quad (2)$$

1. Justifier que toute solution maximale de (2) est définie sur $\mathbf{R}$ tout entier, puis donner la structure de l'ensemble des solutions maximales de (2).

L'équation (2) est une équation différentielle linéaire scalaire du second ordre. Les coefficients $t \mapsto 3$ et $t \mapsto (2 + \theta(t))$ sont continus sur $\mathbf{R}$. Ainsi, toutes les solutions maximales de (2) sont globales, c'est-à-dire définies sur $\mathbf{R}$ tout entier. De plus, l'ensemble des solutions maximales de (2) est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}^2(\mathbf{R}, \mathbf{R})$, de dimension 2.

2. On suppose que $u: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ est une solution de (2). On pose pour tout $t \in \mathbf{R}$,

$$w(t) = e^{-t} \int_0^t e^s \theta(s) u(s) ds - e^{-2t} \int_0^t e^{2s} \theta(s) u(s) ds.$$

(a) Justifier que w est dérivable et calculer w' .

La fonction $s \mapsto e^s \theta(s) u(s)$ est continue sur $\mathbf{R}$ donc par le théorème fondamental de l'analyse $t \mapsto \int_0^t e^s \theta(s) u(s) ds$ est dérivable sur $\mathbf{R}$. De même, $t \mapsto \int_0^t e^{2s} \theta(s) u(s) ds$ est dérivable sur $\mathbf{R}$. Ainsi, par somme et produit, w est dérivable sur $\mathbf{R}$, et pour tout $t \in \mathbf{R}$,

$$\begin{aligned} w'(t) &= -e^{-t} \int_0^t e^s \theta(s) u(s) ds + e^{-t} e^t \theta(t) u(t) + 2e^{-2t} \int_0^t e^{2s} \theta(s) u(s) ds - e^{-2t} e^{2t} \theta(t) u(t) \\ &= -e^{-t} \int_0^t e^s \theta(s) u(s) ds + 2e^{-2t} \int_0^t e^{2s} \theta(s) u(s) ds \end{aligned}$$

(b) Justifier que w est deux fois dérivable et calculer w'' .

Les termes apparaissant dans w' sont les mêmes que ceux apparaissant dans w donc w' est dérivable et pour tout $t \in \mathbf{R}$,

$$\begin{aligned} w''(t) &= e^{-t} \int_0^t e^s \theta(s) u(s) ds - e^{-t} e^t \theta(t) u(t) - 4e^{-2t} \int_0^t e^{2s} \theta(s) u(s) ds + 2e^{-2t} e^{2t} \theta(t) u(t) \\ &= \theta(t) u(t) + e^{-t} \int_0^t e^s \theta(s) u(s) ds - 4e^{-2t} \int_0^t e^{2s} \theta(s) u(s) ds \end{aligned}$$

(c) On note $v = u + w$. Vérifier que pour tout $t \in \mathbf{R}$, $v''(t) + 3v'(t) + 2v(t) = 0$.

Soit $t \in \mathbf{R}$. En utilisant que u est solution de (2), et les calculs précédents, on a

$$\begin{aligned}
& v''(t) + 3v'(t) + 2v(t) \\
&= u''(t) + 3u'(t) + 2u(t) + w''(t) + 3w'(t) + 2w(t) \\
&= -\theta(t)u(t) + \theta(t)u(t) + e^{-t} \int_0^t e^s \theta(s) u(s) ds - 4e^{-2t} \int_0^t e^{2s} \theta(s) u(s) ds \\
&\quad - 3e^{-t} \int_0^t e^s \theta(s) u(s) ds + 6e^{-2t} \int_0^t e^{2s} \theta(s) u(s) ds \\
&\quad + 2e^{-t} \int_0^t e^s \theta(s) u(s) ds - 2e^{-2t} \int_0^t e^{2s} \theta(s) u(s) ds \\
&= 0
\end{aligned}$$

(d) En déduire qu'il existe $C \geq 0$ tel que pour tout $t \geq 0$, $|v(t)| \leq Ce^{-t}$.

v est solution d'une équation linéaire du second ordre homogène, à coefficients constants.

L'équation caractéristique associée est $r^2 + 3r + 2 = 0$, ses racines sont -1 et -2 . On en déduit qu'il existe $a, b \in \mathbf{R}$ tels que pour tout $t \in \mathbf{R}$, $v(t) = ae^{-t} + be^{-2t}$.

Ainsi, pour tout $t \in \mathbf{R}_+$, $|v(t)| \leq (|a| + |b|)e^{-t}$.

(e) On note $\varphi: t \mapsto e^t |u(t)|$. Montrer que pour tout $t \geq 0$,

$$\varphi(t) \leq C + 2 \int_0^t |\theta(s)| \varphi(s) ds.$$

Soit $t \geq 0$. On écrit

$$\begin{aligned}
\varphi(t) &= e^t |u(t)| = e^t |v(t) - w(t)| \\
&\leq e^t |v(t)| + e^t |w(t)| \\
&\leq C + e^t \left(e^{-t} \int_0^t e^s |\theta(s)| |u(s)| ds + e^{-2t} \int_0^t e^{2s} |\theta(s)| |u(s)| ds \right) \quad \text{par 1.(d)} \\
&\leq C + \int_0^t |\theta(s)| \varphi(s) ds + \int_0^t e^{-t+s} |\theta(s)| \varphi(s) ds \quad \text{en utilisant } \varphi(s) = e^s |u(s)| \\
&\leq C + \int_0^t |\theta(s)| \varphi(s) ds + \int_0^t |\theta(s)| \varphi(s) ds
\end{aligned}$$

car pour tout $s \in [0, t]$, $e^{-t+s} \leq 1$. Ainsi,

$$\varphi(t) \leq C + 2 \int_0^t |\theta(s)| \varphi(s) ds.$$

(f) En déduire que φ est bornée sur $\mathbf{R}_+$.

On peut appliquer le lemme de Gronwall forme intégrale à φ . En effet, φ et $|\theta|$ sont continues et positives. On en déduit que pour tout $t \geq 0$,

$$\varphi(t) \leq C \exp \left(\int_0^t |\theta(s)| ds \right) \leq C \exp \left(\int_0^{+\infty} |\theta(s)| ds \right)$$

Ainsi, φ est bornée sur $\mathbf{R}_+$.

(g) En déduire que $u(t) \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} 0$.

Comme φ est bornée sur $\mathbf{R}_+$, et que $e^{-t} \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} 0$, on en déduit que $|u(t)| = e^{-t} \varphi(t) \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} 0$.