

Feuille d'exercices n° 3

**Exercice 1.** Soit  $q : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$  une fonction continue et intégrable, i.e.  $\int_{-\infty}^{+\infty} |q(t)| dt < \infty$ .

On considère l'équation différentielle linéaire :

$$x''(t) + q(t)x(t) = 0, \quad t \in \mathbf{R}. \quad (1)$$

1. Réécrire l'équation (1) sous la forme d'un système différentiel linéaire d'ordre 1 en dimension 2 :  $X'(t) = A(t)X(t)$ ,  $t \in \mathbf{R}$ , où  $A : \mathbf{R} \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbf{R})$ .
2. Justifier que toute solution maximale de (1) est définie sur  $\mathbf{R}$  tout entier, puis donner la structure de l'ensemble des solutions maximales de (1).
3. Soit  $(x_1, x_2)$  un système fondamental de solutions de (1). On définit leur wronskien  $w$  par : pour tout  $t \in \mathbf{R}$ ,  $w(t) = x_1(t)x_2'(t) - x_1'(t)x_2(t)$ .  
Faire le lien avec la notion de wronskien pour le système différentiel de la question 1. Écrire l'équation différentielle satisfaite par  $w$ .
4. Soit  $x : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$  une solution bornée de (1). Montrer que  $\lim_{t \rightarrow +\infty} x'(t) = 0$ .
5. Montrer que l'équation (1) admet des solutions non bornées. *Indication : on pourra considérer un système fondamental de solutions et leur wronskien.*

**Exercice 2.** Soit  $\theta : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$  une fonction continue telle que  $\int_0^{+\infty} |\theta(t)| dt < \infty$ .

On considère l'équation différentielle linéaire :

$$x''(t) + (1 + \theta(t))x(t) = 0, \quad t \in \mathbf{R}. \quad (2)$$

On suppose que  $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$  est une solution de (2). On pose pour tout  $t \in \mathbf{R}$ ,

$$g(t) = f(t) + \int_0^t \theta(s)f(s) \sin(t-s) ds.$$

1. Vérifier que pour tout  $t \in \mathbf{R}$ ,  $g''(t) + g(t) = 0$ .
2. En déduire qu'il existe  $A \geq 0$  tel que pour tout  $t \geq 0$ ,  $|f(t)| \leq A + \int_0^t |\theta(s)| \cdot |f(s)| ds$ .
3. Montrer que  $f$  est bornée sur  $\mathbf{R}_+$ .

**Exercice 3.** Dans les trois cas suivants, déterminer l'ensemble des solutions maximales de l'équation différentielle  $y'(t) = Ay(t)$ ,  $t \in \mathbf{R}$  :

$$(i) \ A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}, \quad (ii) \ A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad (iii) \ A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Dans le cas (i), déterminer la solution vérifiant  $y(1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ .

**Exercice 4.** Soit  $u \in \mathbf{R}^3$  tel que  $\|u\|_2 = 1$ . Pour deux vecteurs  $x$  et  $y$  dans  $\mathbf{R}^3$ , on note  $x \cdot y$  leur produit scalaire (canonique). On rappelle la définition du produit vectoriel de deux vecteurs  $x$  et  $y$  dans  $\mathbf{R}^3$  :  $x \wedge y$  est le vecteur de  $\mathbf{R}^3$  tel que pour tout  $z \in \mathbf{R}^3$ ,  $\det(x, y, z) = (x \wedge y) \cdot z$ ; le vecteur  $x \wedge y$  est orthogonal à  $x$  et à  $y$ . De plus, si  $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$  et  $y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$ , alors on a aussi  $x \wedge y = \begin{pmatrix} x_2 y_3 - x_3 y_2 \\ x_3 y_1 - x_1 y_3 \\ x_1 y_2 - x_2 y_1 \end{pmatrix}$ . On considère l'équation différentielle

$$x'(t) + u \wedge x(t) = 0, \quad t \in \mathbf{R} \quad (3)$$

où  $x : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}^3$ .

1. Soit  $x_0 \in \mathbf{R}^3$ . Justifier que l'équation (3) admet une unique solution maximale vérifiant  $x(0) = x_0$  et que cette solution est définie sur  $\mathbf{R}$ . On note  $x$  cette solution.
2. Montrer que pour tout  $t \in \mathbf{R}$ ,  $\|x(t)\|_2 = \|x_0\|_2$ .
3. Montrer que l'application  $t \mapsto x(t) \cdot u$  est constante sur  $\mathbf{R}$ .
4. Réécrire (3) sous la forme  $x'(t) = Ax(t)$ .
5. Calculer explicitement la solution dans le cas  $u = e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ . Dessiner la trajectoire dans un repère de  $\mathbf{R}^3$ .
6. Donner l'expression de  $x$  dans le cas général.

**Exercice 5.** Deux équations différentielles linéaires à coefficients périodiques

1. *En dimension 1.* Soit  $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$  une fonction continue et  $T$ -périodique (avec  $T > 0$ ). On s'intéresse à l'équation différentielle linéaire suivante

$$u'(t) = f(t)u(t), \quad t \in \mathbf{R}. \quad (4)$$

- (a) *Préliminaire.* On note  $F$  une primitive de  $f$  sur  $\mathbf{R}$ . Donner une condition nécessaire et suffisante sur  $f$  pour que  $F$  soit  $T$ -périodique.
  - (b) Donner la forme des solutions de (4). En déduire une condition nécessaire et suffisante sur la fonction  $f$  pour que les solutions de (4) soient toutes bornées.
  - (c) Dans cette question, on cherche à retrouver ce résultat par une autre méthode.
    - i. Trouver  $b \in \mathbf{R}$  et  $q : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}^{+*}$  une application dérivable et  $T$ -périodique telle que  $u$  est solution de (4) si et seulement si  $v : t \mapsto q(t)u(t)$  est solution de  $v' = bv$ .
    - ii. En déduire une condition nécessaire et suffisante sur la fonction  $f$  pour que les solutions de (4) soient toutes bornées.
2. *En dimension 2.* On considère le système différentiel  $u'(t) = A(t)u(t)$  où pour tout  $t \in \mathbf{R}$ ,

$$A(t) = \begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{pmatrix}.$$

- (a) Soit  $u : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}^2$  une solution de  $u'(t) = A(t)u(t)$ . Trouver une équation différentielle satisfaite par  $r : t \mapsto r(t) = \sqrt{u_1(t)^2 + u_2(t)^2}$  où  $(u_1(t), u_2(t))$  sont les composantes de  $u(t)$ .
- (b) En déduire que les solutions de  $u'(t) = A(t)u(t)$  sont toutes bornées sur  $\mathbf{R}$ .

**Exercice 6.** (★) Une autre équation différentielle linéaire à coefficients périodiques en dimension 2

On considère le système différentiel  $u'(t) = A(t)u(t)$  où pour tout  $t \in \mathbf{R}$

$$A(t) = \begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ \sin t & -\cos t \end{pmatrix}.$$

1. Trouver une matrice  $M \in \mathcal{M}_2(\mathbf{R})$  et une application  $Q : \mathbf{R} \rightarrow \mathcal{O}_2(\mathbf{R})$   $4\pi$ -périodique (où  $\mathcal{O}_2(\mathbf{R})$  est le groupe des matrices orthogonales réelles de dimension 2) telles que pour tout  $t \in \mathbf{R}$ ,

$$A(t) = Q(t)MQ(t)^T.$$

2. Soit  $u$  une solution de  $u'(t) = A(t)u(t)$  et soit  $v : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}^2$ ,  $t \mapsto v(t) = Q(t)^T u(t)$ . Montrer que  $v$  est solution d'un système linéaire à coefficients constants  $v' = Bv$ , où  $B \in \mathcal{M}_2(\mathbf{R})$  est une matrice que l'on déterminera.
3. Réciproquement, soit  $v$  une solution de  $v' = Bv$ . Montrer que  $u : t \mapsto Q(t)v(t)$  est solution de  $u'(t) = A(t)u(t)$ .
4. Les solutions de  $u'(t) = A(t)u(t)$  sont-elles bornées sur  $\mathbf{R}^+$ ? sur  $\mathbf{R}^-$ ? sur  $\mathbf{R}$ ?

*Indication : on pourra étudier le spectre de  $B$ .*

L'étude menée dans les exercices 5 et 6 sur des cas particuliers en dimension  $d \leq 2$  peut être généralisée à une dimension  $d$  quelconque.