

Fiche 4
FONCTIONS MESURABLES
MESURES

Exercice 1. Soit $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$. On définit, pour tout $0 < M < \infty$, la fonction f_M par

$$f_M(x) := \begin{cases} f(x), & \text{si } |f(x)| < M \\ M, & \text{si } f(x) \geq M \\ -M, & \text{si } f(x) \leq -M \end{cases}.$$

Montrer que f est mesurable si et seulement si f_M est mesurable pour tout $M > 0$.

Exercice 2. Soit $(X, \mathcal{M})$ un espace mesurable. Soient $A_1, A_2, \dots$, mesurables deux à deux disjointes et d'union X . Pour chaque A_k , soit $f_k : A_k \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On munit chaque A_k de la tribu trace $\mathcal{M}_{A_k}$. Soit $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) := f_k(x)$ si $x \in A_k$. Montrer que la fonction f est mesurable si et seulement si pour tout k , la fonction f_k est mesurable.

Exercice 3. Soit $(X, \mathcal{M}, \mu)$ un espace mesuré. Prouver ou réfuter les assertions suivantes.

- Si $A \in \mathcal{M}$, alors $\mu(X) = \mu(A) + \mu(A^c)$.
- Si $A, B \in \mathcal{M}$ et $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$, alors A et B sont disjoints.
- Il existe un espace mesuré $(X, \mathcal{M}, \mu)$ tel que $\{\mu(A) ; A \in \mathcal{M}\} = \{0, 1, 2\}$.
- Il existe un espace mesuré $(X, \mathcal{M}, \mu)$ tel que $\{\mu(A) ; A \in \mathcal{M}\} = \{0, 1, 3\}$.
- La mesure de comptage sur $\mathbb{N}$ est finie, respectivement σ -finie.
- Soient $\mathcal{A}$ une famille qui engendre $\mathcal{M}$ et μ_1, μ_2 deux mesures sur $\mathcal{M}$. On suppose que pour tout A dans $\mathcal{A}$ on a $\mu_1(A) = \mu_2(A)$. Alors pour tout T dans $\mathcal{M}$ on a $\mu_1(T) = \mu_2(T)$.

Exercice 4. (Mesures discrètes) Soit $\mathcal{M}$ une tribu contenant les singletons. La mesure μ sur $(X, \mathcal{M})$ est *continue* si, pour tout $x \in X$, $\mu(\{x\}) = 0$. μ est *discrète* s'il existe un ensemble D a. p. d. tel que $\mu(D^c) = 0$.

- Montrer que μ est continue si et seulement si toute partie a. p. d. A de X est μ -négligeable.
- Montrer que μ est discrète si et seulement si il existe une suite $(a_n)_{n \geq 1}$ de points de X et une suite

$$(c_n)_{n \geq 1} \subset [0, \infty] \text{ telles que } \mu = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \delta_{a_n}.$$

- Supposons maintenant μ σ -finie. Montrer que μ s'écrit de façon unique $\mu = \mu_c + \mu_d$, où μ_c est une mesure continue et μ_d est une mesure discrète.

Exercice 5. Soit $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction étagée. Montrer que $f^{-1}(B) \in \mathcal{M}, \forall B \subset \mathbb{R}$.

Exercice 6. Soit μ la mesure de comptage sur $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}))$. Trouver une suite décroissante d'ensembles $(A_n)_{n \geq 0}$ telle que $\mu(A_n)$ ne tend pas vers $\mu\left(\bigcap_{n \geq 0} A_n\right)$.

Exercice 7. Soit μ une mesure finie sur $(X, \mathcal{M})$. Soit $\mathcal{S} \subset \mathcal{M}$ l'ensemble défini par

$$\mathcal{S} := \{A \in \mathcal{M} ; \mu(A) = 0 \text{ ou } \mu(A) = \mu(X)\}.$$

Montrer que $\mathcal{S}$ est une tribu sur X .

Exercice 8. Soit μ une mesure σ -finie sur $(X, \mathcal{M})$. Montrer qu'il existe une suite d'ensembles deux à deux disjoints, de mesure finie et d'union X .

Exercice 9. (Formule de Poincaré)

a) Montrer que si $\mu \left(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n \right) < \infty$ alors

$$\mu \left(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n \right) = \sum_{j=1}^n (-1)^{j+1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_j \leq n} \mu \left(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_j} \right).$$

b) Que devient cette formule dans le cas particulier de la mesure de comptage?

Exercice 10. Soit $\mathcal{M}$ une tribu contenant les singletons. Soit μ une mesure sur $(X, \mathcal{M})$. Soit $D := \{x \in X ; \mu(\{x\}) > 0\}$. Est-il vrai que D est a. p. d.

- a) Si μ est finie?
- b) Si μ est σ -finie?
- c) Si μ est quelconque?