

# Sujet 16.1

Pierre-Yves Bienvenu - <http://www.eleves.ens.fr/~bienvenu>

11 février 2010

## 1 Amuse-gueule

Déterminer le reste de la division euclidienne de  $X^n$  par  $(X - 1)^3$ .

## 2 Plat

Résoudre le système 
$$\begin{cases} x+y+z=1 \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 1 \\ x^2 + y^2 + z^2 = a \end{cases}$$

## 3 Dessert

Un classique! Montrer que tout polynome positif s'écrit comme somme de deux carrés de polynomes.

## 4 Café historique

Les polynômes, c'est l'algèbre par excellence. Les scribes Babyloniens, il y a 4 000 ans, savaient résoudre, outre les équations de degré 1, les équations de degré 2. Des tablettes exhibant de telles résolutions ont été découvertes seulement au début du XXI<sup>ème</sup> siècle (Neugebauer, Thureau-Dangin). Pas de trace en revanche de tels savoirs-faire en Grèce. Ce sont les savants arabes, à commencer par al Kwarizmi, qui ont remis au goût du jour les techniques de résolution (al jabr et al muqabala). Et c'est seulement à partir du XVI<sup>ème</sup> siècle que l'Europe chrétienne s'y met, avec les brillantes écoles algébriques italiennes et allemandes (la Coss). Les "nombres complexes" apparaissent chez des algébristes culottés (Cardan). C'est probablement René Girard qui a produit le premier énoncé qui s'approche de notre théorème de D'Alembert-Gauss. Bizarrement, en rajoutant au champ des nombres les solutions fictives pour les équations du second degré, nous obtenons au passage des solutions pour toutes équations! Mais existe-t-il des formules exprimant les racines en fonction des coefficients pour tout degré? Eh non, comme le révèle Niels Abel vers 1830.

## 5 Café historique

| Baudhayana   | Apastamba    | Diophante d'Alexandrie  | Caroline Arvis  |
|--------------|--------------|---|---|
|              |              |  |  |
| environ -800 | environ -600 | 200-284   | 1990-?  |