

Fiche 7 — Comptage sur les corps finis

Exercice 1 (Isomorphismes exceptionnels) — 1. Construire des isomorphismes

$$\mathrm{PGL}_2(\mathbf{F}_4) \simeq \mathrm{PSL}_2(\mathbf{F}_4) \simeq \mathfrak{A}_5.$$

2. Soit $n \in \mathbf{N}$ et soit $G \leq \mathfrak{S}_n$ un sous-groupe d'indice n . On se propose de démontrer que G est isomorphe à \mathfrak{S}_{n-1} .

- (i) Étudier directement le cas $n \leq 4$.
- (ii) Supposons $n \geq 5$ et soit $X = \mathfrak{S}_n/G$. Démontrer que l'action de \mathfrak{S}_n sur X par translations fournit un isomorphisme $\mathfrak{S}_n \simeq \mathfrak{S}(X)$ identifiant G au stabilisateur d'un point de X . Conclure.
- (iii) Construire des isomorphismes

$$\mathrm{PSL}_2(\mathbf{F}_5) \simeq \mathfrak{A}_5 \quad \text{et} \quad \mathrm{PGL}_2(\mathbf{F}_5) \simeq \mathfrak{S}_5.$$

3. Soit \mathbf{K} un corps commutatif quelconque.

- (i) Démontrer que le déterminant induit un homomorphisme de groupes

$$\delta : \mathrm{PGL}_n(\mathbf{K}) \rightarrow \mathbf{K}^\times / (\mathbf{K}^\times)^n$$

où $(\mathbf{K}^\times)^n$ désigne le sous-groupe de \mathbf{K}^\times formé des puissances n -ièmes.

- (ii) En déduire une suite exacte

$$1 \longrightarrow \mathrm{PSL}_n(\mathbf{K}) \longrightarrow \mathrm{PGL}_n(\mathbf{K}) \xrightarrow{\delta} \mathbf{K}^\times / (\mathbf{K}^\times)^n \longrightarrow 1.$$

3. Supposons que le corps \mathbf{K} soit fini, de caractéristique p . Démontrer que les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) $\mathrm{PSL}_n(\mathbf{K}) \simeq \mathrm{PGL}_n(\mathbf{K})$
- (ii) $\mathrm{pgcd}(n, q-1) = 1$.

Exercice 2 (Cône nilpotent sur un corps fini) — Soit \mathbf{K} un corps fini à q éléments et soit \mathcal{N} l'ensemble des matrices nilpotentes dans $M_3(\mathbf{K})$. On se propose de calculer le cardinal de \mathcal{N} en exploitant l'action de $\mathrm{GL}_3(\mathbf{K})$ par conjugaison sur \mathcal{N} .

1. Décrire les orbites de $\mathrm{GL}_3(\mathbf{K})$ dans \mathcal{N} .
2. Pour chacune de ces orbites, expliciter le stabilisateur d'un élément bien choisi. En déduire le cardinal de chaque orbite.
3. En déduire le cardinal de \mathcal{N} .

Exercice 3 (Décomposition cellulaire des grassmanniennes et q -binôme) — Soit \mathbf{K} un corps commutatif et soit $0 \leq p \leq n$ deux entiers. On rappelle que la *grassmannienne* des p -plans dans \mathbf{K}^n est l'ensemble $\mathrm{Gr}_{p,n}(\mathbf{K})$ des sous-espaces vectoriels de dimension p dans \mathbf{K}^n .

1. On fait agir $\mathrm{GL}_p(\mathbf{K})$ sur l'espace $M_{n,p}(\mathbf{K})$ des matrices de taille $n \times p$ à coefficients dans \mathbf{K} par multiplication à droite.

- (i) Décrire cette action en termes d'opérations matricielles élémentaires.

- (ii) Étant donné $A \in M_{n,p}(\mathbf{K})$, notons $V(A)$ le sous-espace vectoriel de \mathbf{K}^n engendré par les colonnes de A . Démontrer que l'application $A \mapsto V(A)$ induit une bijection

$$\{A \in M_{n,p}(\mathbf{K}) \mid \text{rg}(A) = p\} / \text{GL}_p(\mathbf{K}) \xrightarrow{\sim} \mathbf{Gr}_{p,n}(\mathbf{K}).$$

- (iii) Soit $A \in M_{n,p}(\mathbf{K})$ une matrice de rang p . Démontrer que l'orbite de A contient une matrice de la forme

$$\begin{pmatrix} * & * & & & * \\ \vdots & & & & \\ * & * & & & * \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ & * & & & * \\ & * & & & * \\ & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ & & \ddots & & * \\ & & & & * \\ & & & & 1 \end{pmatrix},$$

où les 1 apparaissent aux lignes $1 \leq i_1 < \cdots < i_p \leq n$ et sont suivis dans leur ligne et leur colonne par des 0, et où les * représentent des scalaires quelconques.

- (iv) Pour tout $i \in \{0, \dots, n\}$, soit V_i le sous-espace de \mathbf{K}^n engendré par les i premiers vecteurs de la base canonique. Avec les notations précédentes, démontrer que les entiers $i_1 < \dots < i_p$ sont précisément les valeurs de i telles que

$$\dim(V(A) \cap V_i) < \dim(V(A) \cap V_{i-1}).$$

- (v) Dédurre de ce qui précède que, dans la question (iii) ci-dessus, chaque orbite contient une unique matrice de la forme considérée.

2. Dédurre de ce qui précède que $\mathbf{Gr}_{p,n}(\mathbf{K})$ est la réunion de parties deux à deux disjointes $\mathbf{Gr}^I(\mathbf{K})$, indexées par l'ensemble des parties à p éléments $I \subset \{1, \dots, n\}$ et telles que

$$\mathbf{Gr}^I(\mathbf{K}) \simeq \mathbf{K}^{d_I},$$

où

$$d_I = \sum_{j=1}^p (i_j - j)$$

si $i_1 < i_2 < \dots < i_p$ sont les éléments de I .

3. On suppose maintenant que \mathbf{K} est un corps fini de cardinal q .

- (i) Expliciter le cardinal de $\text{GL}_n(\mathbf{K})$ et du stabilisateur d'un sous-espace vectoriel de \mathbf{K}^n de dimension p .

- (ii) Dédurre de ce qui précède l'identité suivante :

$$\frac{(q^n - 1)(q^{n-1} - 1) \cdots (q^{n-p+1} - 1)}{(q^p - 1)(q^{p-1} - 1) \cdots (q - 1)} = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_p \leq n} q^{(i_1-1) + (i_2-2) + \cdots + (i_p-p)}.$$

- (iii) Justifier que cette expression est valable lorsque q est considéré comme une indéterminée.

- (iv) On fixe une autre indéterminée t . Démontrer la formule du q -binôme de Newton :

$$\prod_{i=1}^n (1 + q^i t) = \sum_{j=0}^n \binom{n}{j}_q q^{j(j+1)/2} t^j, \quad \text{où } \binom{n}{j}_q = \frac{(q^n - 1)(q^{n-1} - 1) \cdots (q^{n-j+1} - 1)}{(q^j - 1)(q^{j-1} - 1) \cdots (q - 1)}.$$

- (v) Prendre q réel ou complexe et le faire tendre vers 1 dans la formule précédente. Justifier ainsi les notations et la dénomination.