

# TDO – Calculs

## Objectifs :

1. Revoir les définitions et les calculs basiques utilisant les racines carrées, les valeurs absolues et la trigonométrie, qui seront réinvesties dans la suite du cours d'analyse en mathématiques.
2. Apprendre à être plus rigoureux dans les raisonnements en rédigeant complètement les résolutions d'équations.

## 1 Valeur absolue

**Définition 1 (Valeur absolue)** La **valeur absolue** d'un réel  $x$ , notée  $|x|$ , est définie par :

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

La valeur absolue d'un nombre peut s'interpréter comme une distance.

### Propriété 1 (Valeur absolue et distance)

1. Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , le nombre  $|x|$  est la distance de  $x$  à 0 sur l'axe réel.
2. Pour tout  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ , le nombre  $|a - b|$  est la distance entre  $a$  et  $b$ .

**Propriété 2** Pour tout  $x \in \mathbb{R}$  et  $M \in \mathbb{R}$ , on a

$$|x| = M \quad \text{si et seulement si} \quad x = M \text{ ou } x = -M;$$

$$|x| \leq M \quad \text{si et seulement si} \quad -M \leq x \leq M.$$

**Exercice 1** Résoudre l'équation  $|2x - 3| = 8$  dans  $\mathbb{R}$ .

**Exercice 2** Résoudre l'inéquation  $|2x - 3| \leq 8$  dans  $\mathbb{R}$ .

**Exercice 3** Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  la fonction définie par  $f(x) = |x + 1| - |x| + |x - 2|$ .

Exprimer  $f(x)$  sans valeur absolue (on distinguera plusieurs cas), et tracer l'allure de son graphe. Résoudre ensuite l'équation  $f(x) = 3/2$ .

**Propriété 3 (Inégalité triangulaire)** Pour tout  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$  :

$$|x + y| \leq |x| + |y|.$$

*Démonstration.* — La propriété 2 donne les encadrements  $-|x| \leq x \leq |x|$  et  $-|y| \leq y \leq |y|$ . On en déduit :

$$-(|x| + |y|) \leq x + y \leq |x| + |y|.$$

Donc la propriété 2 de nouveau donne  $|x + y| \leq |x| + |y|$ .

## 2 Racine carrée

**Définition 2 (Racine carrée)** La **racine carrée** d'un nombre réel positif  $x \in \mathbb{R}_+$  est l'unique nombre réel positif dont le carré vaut  $x$ .

*Remarque.* — On a  $\sqrt{x^2} = |x|$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ . On n'a donc pas toujours  $\sqrt{x^2} = x$  : cette égalité est fautive pour les réels strictement négatifs.

**Exercice 4** Résoudre l'inéquation  $\sqrt{2x - 3} \leq \sqrt{-x + 6}$  dans  $\mathbb{R}$ .


**Exercice 5** Résoudre l'inéquation  $\sqrt{2x + 7} < -x - 1$  dans  $\mathbb{R}$ .

**Exercice 6** Résoudre l'inéquation  $\sqrt{x + 7} \geq -x - 1$  dans  $\mathbb{R}$ .

## 3 Trigonométrie

### 3.1 Cercle trigonométrique

**Définition 3 (Cercle trigonométrique)** On appelle **cercle trigonométrique** le cercle de centre  $O$  et de rayon 1, parcouru dans le sens trigonométrique (c'est-à-dire le sens opposé à celui des aiguilles d'une montre).




En notant  $M$  le point du cercle tel que  $(\vec{OA}, \vec{OM}) = \theta$  radians, on voit que  $\cos(\theta)$  est l'abscisse du point  $M$  et  $\sin(\theta)$  son ordonnée. On définit  $\tan(\theta)$  comme étant la longueur  $AT$ .

En utilisant la géométrie dans les triangles rectangles  $HOM$  et  $AOT$ , on trouve :

**Propriété 4** Pour tout  $\theta \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$ ,  $\tan(\theta) = \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)}$ .

Contrairement au cosinus et au sinus, on voit que la tangente n'est pas définie pour tous les réels. En effet, la fonction tangente est définie sur tout réel  $\theta$  tel que  $\cos(\theta) = 0$ . Les solutions de cette équation sont précisément les  $\theta$  de la forme  $\frac{\pi}{2} + k\pi$  avec  $k \in \mathbb{Z}$ .

À l'aide de triangles rectangles bien choisis, on obtient le tableau ci-dessous des valeurs remarquables des fonctions sinus et cosinus et donc la fonction tangente.




Angle	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\pi$
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
tan	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	non défini	0

Les relations ci-dessous ne sont pas à apprendre, mais à savoir retrouver à l'aide du cercle trigonométrique.

Comme  $\theta$  et  $\theta + 2\pi$  ont la même image sur le cercle trigonométrique, on obtient les premières formules de trigonométrie. On dit que les fonctions cos, sin et tan sont *périodiques* et  $2\pi$  est une période pour chacune de ces fonctions. En fait, la fonction tangente est même  $\pi$ -périodique.

**Propriété 5** Pour tout  $\theta \in \mathbb{R}$  :

relation fondamentale	$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$		
périodicité	$\cos(\theta + 2\pi) = \cos \theta$	$\sin(\theta + 2\pi) = \sin \theta$	$\tan(\theta + \pi) = \tan \theta$
parité	$\cos(-\theta) = \cos \theta$	$\sin(-\theta) = -\sin \theta$	$\tan(-\theta) = -\tan \theta$
angles supplémentaires	$\cos(\pi - \theta) = -\cos \theta$	$\sin(\pi - \theta) = \sin \theta$	$\tan(\pi - \theta) = -\tan \theta$
demi-tour	$\cos(\pi + \theta) = -\cos \theta$	$\sin(\pi + \theta) = -\sin \theta$	$\tan(\pi + \theta) = \tan \theta$
angles complémentaires	$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin \theta$	$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos \theta$	$\tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \frac{1}{\tan \theta}$
quart de tour	$\cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\sin \theta$	$\sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \cos \theta$	$\tan\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\frac{1}{\tan \theta}$



**Exercice 7** Calculer les valeurs suivantes à l'aide du cercle trigonométrique :

$$\cos\left(\frac{7\pi}{6}\right) \quad \sin\left(\frac{11\pi}{6}\right) \quad \tan\left(\frac{5\pi}{3}\right) \quad \cos\left(-\frac{5\pi}{6}\right) \quad \sin\left(\frac{7\pi}{4}\right) \quad \tan\left(-\frac{3\pi}{4}\right)$$

$$\cos\left(-\frac{16\pi}{3}\right) \quad \sin\left(\frac{11\pi}{2}\right) \quad \tan\left(-\frac{\pi}{6}\right) \quad \cos\left(-\frac{5\pi}{4}\right) \quad \sin\left(\frac{71\pi}{6}\right) \quad \tan\left(\frac{3\pi}{4}\right)$$

**Propriété 6 (Quelques formules)**

**Formules d'addition :** pour tous  $\theta, \varphi \in \mathbb{R}$  :

$$\begin{aligned} \cos(\theta + \varphi) &= \cos \theta \cos \varphi - \sin \theta \sin \varphi & \sin(\theta + \varphi) &= \sin \theta \cos \varphi + \cos \theta \sin \varphi \\ \cos(\theta - \varphi) &= \cos \theta \cos \varphi + \sin \theta \sin \varphi & \sin(\theta - \varphi) &= \sin \theta \cos \varphi - \cos \theta \sin \varphi \end{aligned}$$

**Formules de duplication :** pour  $\theta = \varphi$  :

$$\begin{aligned} \cos(2\theta) &= \cos^2(\theta) - \sin^2(\theta) = 2\cos^2(\theta) - 1 = 1 - 2\sin^2(\theta) & \sin(2\theta) &= 2\sin \theta \cos \theta \\ \cos^2(\theta) &= \frac{1 + \cos(2\theta)}{2} & \sin^2(\theta) &= \frac{1 - \cos(2\theta)}{2} \end{aligned}$$

**Exercice 8** En utilisant l'égalité  $\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$ , calculer  $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$  et en déduire  $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$ .


**Exercice 9** A l'aide des formules de duplication, calculer  $\cos\left(\frac{\pi}{8}\right)$ .

## 3.2 Equations et inéquations trigonométriques

À l'aide du cercle trigonométrique, on résout, les équations d'inconnue  $x$ , où  $\alpha$  est fixé :


$$\cos(x) = \cos(\alpha) \iff \begin{cases} \exists k \in \mathbb{Z}, x = \alpha + 2k\pi \\ \text{ou} \\ \exists k \in \mathbb{Z}, x = -\alpha + 2k\pi \end{cases}$$

Ensemble des solutions :  $\{\alpha + 2k\pi, -\alpha + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$




$$\sin(x) = \sin(\alpha) \iff \begin{cases} \exists k \in \mathbb{Z}, x = \alpha + 2k\pi \\ \text{ou} \\ \exists k \in \mathbb{Z}, x = \pi - \alpha + 2k\pi \end{cases}$$

Ensemble des solutions :  $\{\alpha + 2k\pi, \pi - \alpha + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$



$$\tan(x) = \tan(\alpha) \iff \exists k \in \mathbb{Z}, x = \alpha + k\pi$$

Ensemble des solutions :  $\{\alpha + k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$



**Exercice 10** Résoudre les équations ou inéquations suivantes dans l'intervalle proposé :

- a)  $\cos x = \frac{1}{2}$  sur  $\mathbb{R}$ .      b)  $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$  sur  $\mathbb{R}$ , sur  $I = [0, 2\pi]$ .
- a)  $\sin x = -\frac{1}{2}$  sur  $\mathbb{R}$ .      b)  $\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$  sur  $\mathbb{R}$ , sur  $I = [0, 2\pi]$ , sur  $J = \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}\right]$ .
- a)  $\cos x \geq -\frac{\sqrt{3}}{2}$  sur  $[0, 2\pi]$ .      b)  $\cos x < \frac{1}{2}$  sur  $\mathbb{R}$ , sur  $I = [-\pi, \pi]$ .
- $\sin x > -\frac{1}{2}$  sur  $I = [0, 3\pi]$ .
- a)  $\tan x = \sqrt{3}$  sur  $\mathbb{R}$  puis sur  $I = [-\pi, \pi]$ .      b)  $\tan x \geq 1$  sur  $I = [0, 2\pi]$ .
- $\sin(3x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$  sur  $\mathbb{R}$  puis sur  $I = [-\pi, \pi]$ .

### Exercice 11

Si  $a \in [-1, 1]$ , la touche  $\cos^{-1}$  ou **arccos** de la calculatrice permet d'obtenir un réel  $\alpha$  contenu dans l'intervalle  $[0, \pi]$  tel que  $\cos(\alpha) = a$ .

Si  $b \in [-1, 1]$ , la touche  $\sin^{-1}$  ou **arcsin** de la calculatrice permet d'obtenir un réel  $\beta$  contenu dans l'intervalle  $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$  tel que  $\sin(\beta) = b$ .

À l'aide d'une calculatrice, donner une valeur approchée à  $10^{-2}$  près des réels  $\theta$ ,  $\varphi$  et  $\psi$  tels que :

- $\cos \theta = -0,85$  et  $\theta \in [\pi, 2\pi]$ .
- $\cos \varphi = 0,4$ ;  $\sin \varphi < 0$  et  $\varphi \in [0, 2\pi[$ .
- $\sin \psi = 0,7$  et  $\psi \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$ .

**Exercice 12** Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations et inéquations suivantes :

- $\cos 2x + \cos x = 0$ .
- $\cos 2x + \cos x = -1$ .
- $\cos 2x + 2\sin^2 x - 2\sin x \leq 0$ .
- $\cos 4x - 2\sqrt{3}\cos 2x + \frac{5}{2} = 0$ .
- $\frac{\sqrt{3}}{2}\sin x - \frac{1}{2}\cos x \geq 0$ .
- $\cos 3x + \sin 3x = \frac{\sqrt{6}}{2}$ .

*En complément...*

**INSA** INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES LYON

Trigonométrie

Aimé Lachal

http://math.univ-lyon1.fr/~alachal/diaporamas/diaporama\_trigonometrie.pdf