

### Feuille 6 - Types et saturation

**Exercice 1.** Soit  $\mathfrak{M}$  une  $L$ -structure,  $T$  la théorie de  $\mathfrak{M}$  et  $p \in S_n(T)$ . Supposons que pour chaque extension élémentaire  $\mathfrak{N}$  de  $\mathfrak{M}$ , il y a au plus un nombre fini de réalisations de  $p$  dans  $\mathfrak{N}$  (un tel type est dit *algébrique*).

1. Montrer qu'il existe une formule  $\phi(\bar{x}) \in p$  qui n'est satisfaite que par un nombre fini d'éléments dans  $\mathfrak{M}$ .
2. Montrer que toute réalisation de  $p$  dans une extension élémentaire de  $\mathfrak{M}$  est nécessairement dans  $\mathfrak{M}$ .
3. Soit  $\phi(\bar{x}) \in p$  ayant un nombre fini  $m$  de réalisations dans  $\mathfrak{M}$ , et telle que  $m$  soit minimal. Montrer que  $\phi$  isole  $p$ , c'est-à-dire que  $p$  est l'unique type de  $S_n(T)$  contenant  $\phi$ .

**Exercice 2.** 1. Pourquoi la théorie des relations d'équivalence ayant une infinité de classes toutes infinies est-elle complète?

2. Montrer que cette théorie élimine les quantificateurs.
3. Combien cette théorie a-t-elle de 1-types, de 2-types, de 3-types?

**Exercice 3.** Soit  $L = \{P_i : i \in \mathbb{N}\}$  où les  $P_i$  sont des relations unaires. Soit  $T$  la théorie dans le langage  $L$  qui dit que les  $P_i$  sont deux à deux disjoints et que chaque  $P_i$  est infini.

1. Montrer que  $T$  est complète et élimine les quantificateurs.
2. Décrire  $S_1(T)$ . Les types de  $S_1(T)$  sont-ils réalisés dans chacun des modèles de  $T$ ?

**Exercice 4.** On considère la théorie  $T$  de  $\mathbb{R}$  en tant que corps. Montrer que  $|S_1(T)| = 2^{\aleph_0}$ .

**Exercice 5.** Soit  $T$  la théorie des ordres totaux discrets sans extrémités dans le langage  $\{<\}$ .

1. Donner une axiomatisation de  $T$ .
2. Combien  $T$  a-t-elle de modèles dénombrables?
3. Montrer que  $T$  n'élimine pas les quantificateurs.
4. On considère le langage  $L = \{<, S\}$  où  $S$  est une fonction unaire et dans ce langage, la théorie  $T' = T \cup \{\forall x x < S(x) \wedge \neg \exists y (x < y < S(x))\}$ . Montrer que  $T'$  est complète et élimine les quantificateurs.
5. En déduire que  $T$  est également complète et décrire les  $n$ -types de  $T$ .
6. Une théorie est dite *modèle-complète* si pour tous modèles  $\mathfrak{M}$  et  $\mathfrak{N}$  de cette théorie, si  $\mathfrak{M}$  est sous-structure de  $\mathfrak{N}$  alors  $\mathfrak{M}$  est sous-structure élémentaire de  $\mathfrak{N}$ . Montrer que  $T'$  est modèle-complète mais que  $T$  ne l'est pas.

**Exercice 6.** On considère les structures suivantes, dans le langage des corps :  $\mathbb{Q}, \overline{\mathbb{Q}}, \mathbb{R}$ , et  $\mathbb{C}$  (où  $\overline{\mathbb{Q}}$  désigne la clôture algébrique de  $\mathbb{Q}$ ). Quelles structures de cette liste sont-elles  $\omega$ -saturées ?

**Exercice 7.** Soit  $\mathcal{M}$  une structure  $\omega$ -saturée,  $\mathcal{N}$  une extension élémentaire de  $\mathcal{M}$  et  $(n_i)_{i \in \mathbb{N}}$  une famille d'éléments de  $N$ . Montrer qu'il existe une famille  $(m_i)_{i \in \mathbb{N}}$  telle que pour tout  $k \in \mathbb{N}$   $(m_0, \dots, m_k)$  et  $(n_0, \dots, n_k)$  aient le même type.

**Exercice 8.** Soit le langage  $L = \{<, c_i : i \in \mathbb{N}\}$  où  $<$  est une relation binaire et les  $c_i$  sont des symboles de constante. Soit  $T$  la théorie des ordres totaux denses sans extrémités telle que pour tout  $i \in \mathbb{N}$  on ait  $c_i < c_{i+1}$ .

1. Soit  $\mathcal{M}$  un modèle  $\omega$ -saturé de  $T$ . Montrer que l'ensemble  $A$  des éléments majorant tous les  $c_i$  n'a pas de plus petit élément.
2. Montrer que  $T$  est complète et élimine les quantificateurs.
3. Construire un modèle dénombrable de  $T$  qui contient un plus petit majorant de la suite  $(c_i)$ .
4. Montrer que  $T$  a exactement trois modèles dénombrables non isomorphes.
5. Montrer qu'il existe deux des modèles dénombrables non isomorphes qui se plongent l'un dans l'autre.

**Exercice 9.** Soit le langage  $L = \{P_i, Q_i : i \in \omega\}$  où les  $P_i$  et les  $Q_i$  sont des relations unaires. Soit  $T$  la théorie dans ce langage qui dit que les  $P_i$  sont deux à deux disjoints, que les  $Q_i$  sont également deux à deux disjoints et que, pour tout  $i, j$  l'intersection  $P_i \cap Q_j$  est infinie.

1. Donner un exemple de modèle de  $T$ .
2. Expliquer brièvement pourquoi  $T$  est complète et élimine les quantificateurs.
3. Combien  $T$  a-t-elle de modèles dénombrables (à isomorphisme près) ? A-t-elle un modèle dénombrable  $\omega$ -saturé ?

**Exercice 10.** Soit  $\mathfrak{M}, \mathfrak{N}$  deux  $L$ -structures.

1. Montrer que si  $\mathfrak{M}, \mathfrak{N}$  sont  $\infty$ -équivalentes et que  $\mathfrak{M}$  est  $\omega$ -saturée alors  $\mathfrak{N}$  est  $\omega$ -saturée.
2. On dit que  $f : A \rightarrow \mathfrak{N}$  (où  $A \subset M$ ) est une application partielle élémentaire si pour tout  $a_1, \dots, a_n \in A$  et toute formule  $\varphi$  on a

$$\mathfrak{M} \models \varphi(a_1, \dots, a_n) \Leftrightarrow \mathfrak{N} \models \varphi(f(a_1), \dots, f(a_n)) .$$

Montrer qu'une structure dénombrable  $\omega$ -saturée est *homogène* : pour toute application partielle élémentaire  $f_0 : A \rightarrow \mathfrak{M}$  définie sur une partie finie  $A$  de  $M$ , et tout  $m \in M$ , il existe  $n \in N$  tel que l'extension de  $f_0$  obtenue en posant  $f(m) = n$  soit encore élémentaire.

3. Montrer que deux structures élémentairement équivalentes, dénombrables et  $\omega$ -saturées sont isomorphes.