

# Licence STS Mention MATH L3 - ATN

## Permutations et groupes de permutations

### 1 Les permutations

La permutation

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 3 & 7 & 8 & 9 & 4 & 5 & 2 & 1 & 6 \end{pmatrix}$$

du groupe symétrique  $\mathfrak{S}_9$  admet la décomposition en cycles à supports disjoints ;

$$\sigma = (1, 3, 8)(2, 7)(4, 9, 6, 5)$$

Avec SAGE on peut définir  $\sigma$  à partir de la *liste*  $[3, 7, 8, 9, 4, 5, 2, 1, 6]$  ou à partir de la décomposition en cycles représentée par la *liste de tuples*  $[(1, 3, 8), (2, 7), (4, 9, 6, 5)]$  :

```
sage: sigma = PermutationGroupElement([(1,3,8), (2,7), (4,9,6,5)])
sage: sigma
(1,3,8)(2,7)(4,9,6,5)
sage: sigma_prime= PermutationGroupElement([3, 7, 8, 9, 4, 5, 2, 1, 6])
sage: sigma_prime
(1,3,8)(2,7)(4,9,6,5)
sage: sigma_prime == sigma
True
```

On peut passer de l'une à l'autre de ces représentations :

```
sage: sigma.list()
[3, 7, 8, 9, 4, 5, 2, 1, 6]
sage: sigma_prime.cycles()
[(1,3,8), (2,7), (4,9,6,5)]
```

On peut déterminer l'ordre et la signature de  $\sigma$  :

```
sage: sigma.order()
12
sage: sigma.sign()
1
```

On peut voir  $\sigma$  comme élément du groupe symétrique  $\mathfrak{S}_9$  :

```
sage: S9 = parent(sigma)
sage: S9
Symmetric group of order 9! as a permutation group
sage: sigma in S9
True
sage: S9.order() == factorial(9)
True
sage: S9.degree()
9
```

Le groupe symétrique  $\mathfrak{S}_9$  est engendré par les deux permutations  $g_0 = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)$  et  $g_1 = (1, 2)$ . On peut trouver une expression de  $\sigma$  en fonction de ces générateurs :

```

sage: g = S9.gens()
sage: g
[(1,2,3,4,5,6,7,8,9), (1,2)]
sage: decomp = sigma.word_problem(g, False)
sage: decomp[0]
'x1^-8*x2*x1^3*x2^-1*x1^-1*x2^-1*x1^-1*x2^-1*x1^3*x2^-1*x1^-1*x2^-1*
x1^-1*x2^-1*x1^2*x2'
sage: x1 = g[0]; x2 = g[1]; x1,x2
((1,2,3,4,5,6,7,8,9), (1,2))
sage: x1^-8*x2*x1^3*x2^-1*x1^-1*x2^-1*x1^-1*x2^-1*x1^3*x2^-1*x1^-1*x2^-1*x1^-1
*x2^-1*x1^2*x2
(1,3,8)(2,7)(4,9,6,5)

```

*ATTENTION* à l'ordre des facteurs dans un produit de permutations Soient  $a, b \in \mathfrak{S}_n$ ; dans SAGE le produit  $a \star b$  calcule la permutation  $b \circ a$  :

```

sage: a = PermutationGroupElement([(1,2)])
sage: a
(1,2)
sage: b = PermutationGroupElement([(1,2,3)])
sage: b
(1,2,3)
sage: a*b
(1,3)

```

## 2 Les groupes de permutations

Dans SAGE le groupe symétrique, certains de ses sous-groupes tels que les groupes alternées, diédraux sont pré-définis :

```

sage: S6 = SymmetricGroup(6)
sage: S6
Symmetric group of order 6! as a permutation group
sage: A6 = AlternatingGroup(6)
sage: A6
Alternating group of order 6!/2 as a permutation group
sage: A6.is_normal(S6)
True
sage: S6.quotient_group(A6)
Permutation Group with generators [(1,2)]
sage: A6.is_simple()
True

```

```

sage: D6 = DihedralGroup(6)
sage: D6
Dihedral group of order 12 as a permutation group
sage: D6.list()
[(), (2,6)(3,5), (1,2)(3,6)(4,5), (1,2,3,4,5,6), (1,3)(4,6),
(1,3,5)(2,4,6), (1,4)(2,3)(5,6), (1,4)(2,5)(3,6), (1,5)(2,4),
(1,5,3)(2,6,4), (1,6,5,4,3,2), (1,6)(2,5)(3,4)]
sage: C6 = CyclicPermutationGroup(6)
sage: C6
Cyclic group of order 6 as a permutation group
sage: C6.is_cyclic()
True
sage: C6.is_subgroup(D6)
True

```

On peut obtenir la *table de multiplication* de ces groupes ainsi que le graphe de Cayley :

```

sage: D6.cayley_table()
[ x0  x1  x2  x3  x4  x5  x6  x7  x8  x9  x10  x11]
[ x1  x0  x3  x2  x5  x4  x7  x6  x9  x8  x11  x10]
[ x2  x10 x0  x4  x3  x6  x5  x8  x7  x11  x1  x9]
[ x3  x11 x1  x5  x2  x7  x4  x9  x6  x10  x0  x8]
[ x4  x9  x10 x6  x0  x8  x3  x11  x5  x1  x2  x7]
[ x5  x8  x11 x7  x1  x9  x2  x10  x4  x0  x3  x6]
[ x6  x7  x9  x8  x10 x11  x0  x1  x3  x2  x4  x5]
[ x7  x6  x8  x9  x11 x10  x1  x0  x2  x3  x5  x4]
[ x8  x5  x7  x11  x9  x1  x10  x2  x0  x4  x6  x3]
[ x9  x4  x6  x10  x8  x0  x11  x3  x1  x5  x7  x2]
[x10  x2  x4  x0  x6  x3  x8  x5  x11  x7  x9  x1]
[x11  x3  x5  x1  x7  x2  x9  x4  x10  x6  x8  x0]
sage: Gr = D6.cayley_graph()
sage: show(Gr)

```

On peut considérer un sous-groupe de  $\mathfrak{S}_n$  engendré par un ensemble fini de permutations.

```

sage: tr = [PermutationGroupElement((i,i+1)) for i in range(1,6)]
sage: tr
[(1,2), (2,3), (3,4), (4,5), (5,6)]
sage: S6bis = PermutationGroup(tr)
sage: S6bis
Permutation Group with generators [(5,6), (4,5), (3,4), (2,3), (1,2)]
sage: S6bis.gens()
[(5,6), (4,5), (3,4), (2,3), (1,2)]
sage: S6bis.gens_small()
[(2,6)(3,4,5), (1,4,2)(3,5,6)]
sage: S6 == S6bis
True

```

Voici la liste des groupes de permutation prédéfinis dans SAGE :

- a) *SymmetricGroup*,  $S_n$  of order  $n!$  ( $n$  can also be a list  $X$  of distinct positive integers, in which case it returns  $S_X$ )

- b) `AlternatingGroup`,  $A_n$  or order  $n!/2$  ( $n$  can also be a list  $X$  of distinct positive integers, in which case it returns  $A_X$ )
- c) `DihedralGroup`,  $D_n$  of order  $2n$
- d) `CyclicPermutationGroup`,  $C_n$  of order  $n$
- e) `TransitiveGroup`,  $i^{th}$  transitive group of degree  $n$  from the GAP tables of transitive groups (requires the "optional" package `database_gap`)
- f) `MathieuGroup`(degree), Mathieu group of degree 9, 10, 11, 12, 21, 22, 23, or 24.
- g) `KleinFourGroup`, subgroup of  $S_4$  of order 4 which is not  $C_2 \times C_2$

### 3 Les groupes de matrices

Les groupes classiques de matrices sont aussi prédéfinis et sont traités comme des groupes de permutation :

- a) `PGL`( $n, q$ ), projective general linear group of  $n \times n$  matrices over the finite field  $GF(q)$
- b) `PSL`( $n, q$ ), projective special linear group of  $n \times n$  matrices over the finite field  $GF(q)$
- c) `PSp`( $2n, q$ ), projective symplectic linear group of  $2n \times 2n$  matrices over the finite field  $GF(q)$
- d) `PSU`( $n, q$ ), projective special unitary group of  $n \times n$  matrices having coefficients in the finite field  $GF(q^2)$  that respect a fixed nondegenerate sesquilinear form, of determinant 1.
- e) `PGU`( $n, q$ ), projective general unitary group of  $n \times n$  matrices having coefficients in the finite field  $GF(q^2)$  that respect a fixed nondegenerate sesquilinear form, modulo the centre.

### 4 Exercices

**Exercice 1.** Dans le groupe  $\mathfrak{S}_7$  les deux permutations suivantes sont-elles conjuguées :

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 5 & 3 & 4 & 2 & 1 & 7 & 6 \end{pmatrix} \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & 5 & 7 & 6 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

Déterminer un élément  $g \in \mathfrak{S}_7$  tel que  $\tau = g \circ \sigma \circ g^{-1}$ .

**Exercice 2.**

Dans le groupe symétrique  $\mathfrak{S}_9$  on considère les cycles  $\sigma = (1, 4, 5, 2, 3, 6)$  et  $\tau = (7, 6, 5, 8, 9)$ .

1. Quelle est la signature de  $\pi = \sigma\tau$  ?
2. Décomposer  $\pi$  en produits de cycles disjoints. Quel est l'ordre de  $\pi$  ?
3. Expliquer pourquoi  $\pi^{2001}$  est produit de trois transpositions disjointes. Calculer ces trois transpositions.

**Exercice 3.**

On considère la permutation de l'ensemble  $\{1, \dots, 9\}$  :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 3 & 7 & 8 & 9 & 4 & 5 & 2 & 1 & 6 \end{pmatrix}$$

Décomposer  $\sigma$  en produits de transpositions  $(i, i + 1)$  pour  $1 \leq i \leq 8$ .

**Exercice 4.**

On considère la permutation

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Quel est l'ordre de  $\sigma$  ?
2. Quelle est la signature de  $\sigma$  ?
3. Ecrire une fonction *python* permettant de calculer le nombre d'inversions d'une permutation. Quel est le nombre d'inversions de  $\sigma$ .
4. Donner une décomposition en produits de transpositions de  $\sigma$  en produit de transpositions simples.

**Exercice 5.**

1. Soit  $D$  le groupe diédral d'ordre 8 ;
  - (a) Donner des générateurs de  $D$ .
  - (b) Quel est l'exposant de  $D$  ?
  - (c)  $D$  est-il abélien
  - (d) Enumérer les éléments d'ordre 2 de  $D$ .
2. Soit  $Q$  le sous-groupe de  $\mathfrak{S}_8$  engendré par les permutations  $a = (1, 2, 5, 4)(3, 8, 6, 7)$  et  $b = (1, 8, 5, 7)(2, 3, 4, 6)$ .
  - (a) Quel est l'ordre de  $Q$  ?
  - (b) Quel est l'exposant de  $Q$  ?
  - (c)  $D$  est-il abélien
  - (d) Enumérer les éléments d'ordre 2 de  $D$ .
3. Les groupes  $D$  et  $Q$  sont-ils isomorphes ?

**Problème 6.**

1. Construire le groupe symétrique  $\mathfrak{S}_{11}$  et vérifier que son ordre est  $11!$  (on utilisera que  $\mathfrak{S}_{11}$  est engendré par les permutations  $t = (1, 2)$  et  $c = (2, \dots, 11, 1)$ ).
2. (a) Déterminer l'ordre du sous-groupe  $E$  de  $\mathfrak{S}_{11}$  engendré par  $\sigma = (1, 3, 6)(2, 9, 5)(4, 7, 8)$  et  $\tau = (1, 4, 5)(2, 3, 7)(6, 8, 9)$ .
  - (b) Vérifier que  $E$  est abélien.
  - (c) Déterminer l'ordre de  $\sigma$  et de  $\tau$ . Qu'en conclure ?
3. On considère les permutations :

$$u = (1, 3, 7, 4)(2, 8, 5, 6)$$

$$v = (1, 2, 7, 5)(3, 6, 4, 8)$$

$$w = (1, 6, 7, 8)(2, 3, 5, 4)$$

- (a) Vérifier que  $w = v \circ u$ .
- (b) Vérifier que le sous-groupe  $Q$  de  $\mathfrak{S}_{11}$  engendré par  $u$  et  $v$  est non abélien d'ordre 8.
- (c) Former la liste des éléments de  $Q$ . En déduire que  $Q$  est le groupe quaternionique.
4. Soit  $H$  le sous-groupe de  $\mathfrak{S}_{11}$  engendré par  $E \cup Q$  ; vérifier que  $H = Q \rtimes E$ .

5. On considère les permutations :

$$g_1 = (1, 6)(3, 4)(7, 8)(9, 10)$$

$$g_2 = (1, 4)(3, 7)(6, 8)(10, 11)$$

(a) Quel est l'ordre du sous-groupe  $M_{11}$  de  $\mathfrak{S}_{11}$  engendré par  $E \cup Q \cup \{g_1, g_2\}$  ?

(b) Combien  $M_{11}$  possède-t-il de 11-groupes de Sylow ?

6. Vérifier que  $\{g \in M_{11}/g(11) = 11\}$  est le sous-groupe de  $\mathfrak{S}_{11}$  engendré par  $H \cup \{g_1\}$ .

### Exercice 7.

1. Trouver un isomorphisme  $f$  entre les groupes  $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_7)$  et  $\mathrm{PSL}_3(\mathbb{F}_2)$

2. Exprimer les images d'un système générateur de  $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_7)$  par l'isomorphisme  $f$  en fonction d'un système générateur de  $\mathrm{PSL}_3(\mathbb{F}_2)$

3. On considère l'ensemble

$$X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$

des 7 *points* et l'ensemble

$$\mathcal{D} = \{\{1, 2, 4\}, \{2, 3, 5\}, \{3, 4, 6\}, \{4, 5, 7\}, \{5, 6, 1\}, \{6, 7, 2\}, \{7, 3, 1\}\}$$

des 7 *droites* du *plan de Fano*.

Donner la liste des éléments du sous-groupe  $G$  de  $\mathfrak{S}_7$  :

$$G = \{\sigma \in \mathfrak{S}_7 / D \in \mathcal{D} \Rightarrow \sigma(D) \in \mathcal{D}\}$$

4. Vérifier que  $G$  est isomorphe aux groupes  $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_7)$  et  $\mathrm{PSL}_3(\mathbb{F}_2)$ .

5. Vérifier que ces groupes sont simples.