Etudiant 1 :

Cours : Somme de 2 vard indépendantes binomiales de paramétres (n, p) et (m, p).

Exercice 1 :
n $(n \geq 2)$ personnes jettent simultanément une pièce de monnaie. Une personne gagne une partie si elle obtient le contraire de toutes les autres.
Soit X la variable égale au nombre de parties nécessaires pour l'obtention d'un vainqueur. Déterminer X et en déduire $E(X)$ et $V(X)$.

Exercice 2 :
Chaque jour, un parc d'attractions enregistre un nombre Y de visiteurs suivant une loi de Poisson de paramètre λ. Chaque visiteur passe, au hasard et uniformément, par une des n entrées $E_1, \ldots E_n$ du parc.
1. Quel est le nombre moyen de visiteurs chaque jour dans le parc ?
2. On note X_1 le nombre de visiteurs entrant par E_1 en une journée. Déterminer la loi de X_1 et en déduire son espérance et sa variance. *(On pourra d'abord conditionner selon les valeurs de la variable Y).*
3. Sachant qu'un visiteur sur 10 se débrouille pour entrer sans payer, calculer le nombre moyen de visiteurs qui payent et entrent par E_1 par jour.

Etudiant 2 :

Cours : Loi hypergéométrique. Exemples. Espérance.

Exercice 1 :
Soit X une variable aléatoire de loi $\mathcal{B}(n, p)$.
Chaque résultat de X est affiché sur un compteur détraqué. Si X n'est pas nul, le compteur affiche la bonne valeur, si X est nul, il affiche au hasard une valeur entre 1 et n.
On note Y la variable aléatoire égale au nombre affiché.
Déterminer la loi de Y et son espérance.

Exercice 2 :
On dispose d'une pièce truquée, telle que la probabilité d'obtenir Pile est $p \in]0, 1[$. On lance deux fois la pièce : si on obtient FP on a gagné, si on obtient PF on a perdu, sinon on recommence.
Déterminer le nombre moyen de lancers effectués avant la fin du jeu.

Etudiant 3 :

Cours : Loi géométrique. Exemple. Espérance et variance.

Exercice 1 :
Dans une classe de n élèves, la probabilité qu'un élève sache son cours est $p \in]0, 1[$. La probabilité qu'un élève qui sait son cours sache faire l'exercice est $\alpha \in]0, 1[$. Aura une bonne note tout élève qui sait son cours et sait faire l'exercice.
1. Soit X le nombre d'élèves sachant son cours. Déterminer la loi de X.
2. Soit Y le nombre d'élèves ayant une bonne note. Déterminer la loi de Y, son espérance et sa variance.

Exercice 2 :
Pour X une variable suivant une loi de Poisson de paramètre λ.
On définit la variable aléatoire Y par $Y = 0$ lorsque X prend une valeur impaire, et $Y = \dfrac{X}{2}$ sinon.
Déterminer la loi, l'espérance et la variance de Y.