

Soit \mathcal{P} un plan affine euclidien et ABC un triangle non aplati. Dans ce problème, on s'intéresse aux coordonnées barycentriques des points remarquables du triangle dans le repère affine (A, B, C) de \mathcal{P} .

Exemple simple : Des coordonnées barycentriques du centre de gravité G du triangle sont :

$$G : (1, 1, 1).$$

On note par ailleurs O le centre du cercle circonscrit du triangle ABC .

I Résultats préliminaires

1° Lien entre coordonnées barycentriques et certains angles

Soit P un point de la droite (BC) . On note les angles suivants :

$$\gamma = (\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OP}), \quad \beta = (\overrightarrow{OP}, \overrightarrow{OC}).$$

(a) Exprimer \overrightarrow{OB} et \overrightarrow{OC} dans une base orthonormée (i, j) , où $i = \overrightarrow{OP}/OP$.

(b) Montrer que P est le barycentre de $\{(B, \sin \beta), (C, \sin \gamma)\}$.

2° Barycentres et barycentres partiels

Soit M un point du plan et (a, b, c) des coordonnées barycentriques de M dans le repère (A, B, C) du plan.

(a) Montrer que M n'est pas sur la parallèle à (BC) contenant A si et seulement si $b + c \neq 0$.

On suppose que ces conditions sont remplies, et on note P l'intersection de (AP) et (BC) et (b', c') des coordonnées barycentriques de P dans le repère affine (B, C) de la droite (BC) .

(b) Quel lien y a-t-il entre (a, b, c) et (b', c') ?

II Points classiques

1° Centre du cercle circonscrit

(a) Soit P l'intersection des droites (AO) et (BC) (lorsqu'elle existe). Exprimer en fonction de \hat{B} et \hat{C} les angles β et γ de I 1°.

(b) En déduire les coordonnées barycentriques de P dans le repère affine (B, C) .

(c) En déduire que les coordonnées barycentriques de O dans le repère (A, B, C) sont :

$$O : (\sin 2\hat{A}, \sin 2\hat{B}, \sin 2\hat{C}).$$

2° Orthocentre

(a) Supposons que \hat{B} et \hat{C} soient aigus. On note A' la projection orthogonale de A sur (BC) . Calculer BA' et CA' en fonction de AA' , \hat{B} et \hat{C} . En déduire les coordonnées barycentriques de S dans le repère affine (B, C) .

(b) Traiter le cas où \hat{B} est obtus.

(c) Montrer enfin que des coordonnées barycentriques de l'orthocentre H dans le repère (A, B, C) sont :

$$H : (\tan \hat{A}, \tan \hat{B}, \tan \hat{C}).$$

3° Centre du cercle inscrit

On note I le centre du cercle inscrit à ABC .

(a) Montrer qu'il existe $\alpha \in \mathbb{R}^*$ tel que

$$\vec{AI} = \alpha \left(\frac{\vec{AB}}{AB} + \frac{\vec{AC}}{AC} \right).$$

(b) Montrer que des coordonnées barycentriques de I dans le repère (A, B, C) sont :

$$I : (BC, AC, AB).$$

(c) En déduire que des coordonnées barycentriques de I dans le repère (A, B, C) sont :

$$I : (\sin \hat{A}, \sin \hat{B}, \sin \hat{C}).$$

III Un point semi-classique : le point de Gergonne

1° Point de Gergonne

On note A' , B' et C' les points d'intersection respectifs du cercle inscrit à ABC et des droites (BC) , (AC) , (CA) .

(a) A l'aide du théorème de Céva, montrer que les droites (AA') , (BB') et (CC') sont concourantes. On note Γ leur intersection (point de Gergonne).

(b) Montrer que des coordonnées barycentriques de Γ dans le repère (A, B, C) sont :

$$\Gamma : \left(\tan \frac{\hat{A}}{2}, \tan \frac{\hat{B}}{2}, \tan \frac{\hat{C}}{2} \right).$$

2° Droite de Gergonne

On note A'' , B'' et C'' les points d'intersection respectifs :

$$(AI) \cap (BC), \quad (BI) \cap (AC), \quad (CI) \cap (AB),$$

et P , Q et R les intersections respectives, supposées exister :

$$(BC) \cap (B''C''), \quad (AC) \cap (A''C''), \quad (AB) \cap (A''B'').$$

Montrer à l'aide du théorème de Desargues que les points P , Q , R sont alignés. La droite qui les contient est appelée droite de Gergonne du triangle ABC .

IV Le Savant Cosinus

Inversement, on note Ω le Savant Cosinus, i.e. le point de coordonnées barycentriques

$$\Omega : (\cos \hat{A}, \cos \hat{B}, \cos \hat{C}).$$

1° Construction géométrique de Ω

2° Alignement de G , Γ , Ω

On pose

$$a = \tan \frac{\hat{A}}{2}, \quad b = \tan \frac{\hat{B}}{2}, \quad c = \tan \frac{\hat{C}}{2}.$$

(a) Démontrer que les points G , Γ , Ω sont alignés si, et seulement si on a :

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \tan \frac{\hat{A}}{2} & \tan \frac{\hat{B}}{2} & \tan \frac{\hat{C}}{2} \\ \cos \hat{A} & \cos \hat{B} & \cos \hat{C} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ \frac{1-a^2}{1+a^2} & \frac{1-b^2}{1+b^2} & \frac{1-c^2}{1+c^2} \end{vmatrix} = 0.$$

On note alors f la fonction définie sur \mathbb{R} par

$$f(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2} \quad (x \in \mathbb{R}),$$

et \mathcal{C} sa courbe représentative dans un repère d'un plan affine. On note R , S , T les points de \mathcal{C} d'abscisses respectives a , b , c .

(b) Montrer que G, Γ, Ω sont alignés, si et seulement si P, Q et R le sont.

On suppose que ABC n'est ni équilatéral, ni isocèle, de sorte que a, b et c sont distincts. Une droite qui contient P, Q, R a donc une équation de la forme

$$y = ux + v,$$

où (x, y) sont les coordonnées du point courant et u, v des réels fixés et $u \neq 0$.

(c) Montrer que si P, Q et R sont alignés, alors a, b et c sont les trois racines d'un polynôme de degré trois, dont on écrira les coefficients en fonction de u et v .

(d) Sous l'hypothèse que P, Q et R sont alignés, en déduire une relation satisfaite par a, b, c , qui ne dépend pas de u et v .

(e) Démontrer que cette relation est en effet satisfaite.

(f) Démontrer alors que G, Γ, Ω sont alignés.

(On pourra exhiber un polynôme de degré 3 dont a, b, c sont solutions, puis montrer que les points P, Q et R sont alignés).

Récapitulatif

point	nom	coordonnées barycentriques
centre de gravité	G	$(1, 1, 1)$
centre du cercle circonscrit	O	$(\sin 2\hat{A}, \sin 2\hat{B}, \sin 2\hat{C})$
orthocentre	H	$(\tan \hat{A}, \tan \hat{B}, \tan \hat{C})$
centre du cercle inscrit	I	$(\sin \hat{A}, \sin \hat{B}, \sin \hat{C})$
point de Gergonne	Γ	$(\tan \frac{\hat{A}}{2}, \tan \frac{\hat{B}}{2}, \tan \frac{\hat{C}}{2})$
savant Cosinus	Ω	$(\cos \hat{A}, \cos \hat{B}, \cos \hat{C})$

D'après F. Rideau, revue de l'APMEP.