
Feuille d'exercices n° 11: Principe des zéros isolés, théorème des résidus

Exercice 1. Soient $R > 0$, $D = D(0, R)$ (disque ouvert), ∂D sa frontière. Soient Ω un domaine contenant \overline{D} et f une fonction holomorphe sur Ω .

1. Montrer que si $f|_{\partial D}$ est constante alors f est constante sur Ω .
2. On suppose que f est non constante et que $|f|_{\partial D}$ est constante égale à c .
 - (a) Montrer que $c \neq 0$ et que pour tout $z \in D$, $|f(z)| < c$.
 - (b) En considérant $g : z \mapsto \frac{1}{\overline{f(z)}}$, montrer que f a au moins un zéro dans D .

Exercice 2. Soit f une fonction entière telle qu'il existe $a, b, c \in \mathbb{R}^*$ tels que pour tout $z \in \mathbb{C}$, $a\operatorname{Re}(f(z)) + b\operatorname{Im}(f(z)) \leq c$. En considérant l'application $z \mapsto \exp((a - ib)f(z))$, montrer que f est constante.

Exercice 3. Soit f une fonction entière. On cherche à montrer que les deux conditions suivantes sont équivalentes :

- (a) Pour tout $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| = 1$, $|f(z)| = 1$.
 - (b) Il existe $c \in \mathbb{C}$ tel que $|c| = 1$ et il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $z \in \mathbb{C}$, $f(z) = cz^n$.
1. Vérifier l'implication (b) \Rightarrow (a).
 2. On suppose la condition (a) satisfaite.
 - (a) Soit n l'ordre du zéro de f à l'origine (on convient que $n = 0$ si $f(0) \neq 0$) et soit $g : z \mapsto f(z)/z^n$. Vérifier que g est entière.
 - (b) Montrer que la fonction h donnée par $h(z) = \overline{g(1/\overline{z})}$ est holomorphe sur \mathbb{C}^* et que pour tout $z \in \mathbb{C}^*$, $g(z)h(z) = 1$. En déduire que g est constante et conclure.

Exercice 4. Soit Ω un domaine de \mathbb{C} .

1. Soient f et g deux fonctions holomorphes sur Ω telles que le produit fg soit nul sur Ω . Montrer que l'une des fonctions est nulle sur Ω .
2. Soit f une fonction holomorphe sur Ω . On suppose qu'il existe deux déterminations de la racine carrée de f , notées g_1 et g_2 . Montrer que $g_1 = g_2$ ou $g_1 = -g_2$.

Exercice 5. Étudier l'existence et l'unicité d'une fonction holomorphe f sur un voisinage connexe de 0 telle que :

1. Pour tout $n \geq 1$, $f(1/n) = \frac{1}{2n+1}$.
2. Pour tout $n \geq 1$, $f(1/n) = e^{-n}$.
3. Pour tout $n \geq 1$, $f(1/n) = e^{-n^2}$.

Exercice 6. Déterminer les zéros de la fonction $z \mapsto 1 - \exp(\frac{z}{z-1})$ dans le disque ouvert $D(0, 1)$. Cela contredit-il le principe des zéros isolés ?

Exercice 7. On fixe $t \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. On pose $a = e^{2i\pi t}$ et on note $U = \{z \in \mathbb{C}, \frac{1}{2} < |z| < \frac{3}{2}\}$. Soit $f : U \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction holomorphe telle que :

$$\forall z \in U, \quad f(az) = f(z).$$

Montrer que f est constante. Cela reste-t-il vrai si on prend $t \in \mathbb{Q}$?

Exercice 8. Calculer $I = \int_{\gamma} f(z)dz$ dans les cas suivants.

1. $\gamma(t) = 2e^{it}, t \in [0, 2\pi]; f(z) = \frac{5z^2+1}{z(z-1)}$.
2. $\gamma(t) = \frac{3}{2}e^{it}, t \in [0, 2\pi]; f(z) = \frac{z}{(z-1)^2(z+2)}$
3. $\gamma(t) = re^{it}, t \in [0, 2\pi]; f(z) = \frac{\exp(1/z)}{z-1}$.

Exercice 9. Soit P un polynôme et γ un lacet contenant tous les zéros de P dans son intérieur. Calculer $\int_{\gamma} z \frac{P'(z)}{P(z)} dz$.

Exercice 10. Soit P un polynôme de degré n n'ayant que des racines simples et soit Q un polynôme de degré $\leq n - 2$. On considère $\gamma_R(t) = Re^{it}, t \in [0, 2\pi]$.

1. Déterminer $\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{\gamma_R} \frac{Q(z)}{P(z)} dz$.
2. Soient z_1, \dots, z_n les racines complexes de P . Calculer $\sum_{k=1}^n \frac{Q(z_k)}{P'(z_k)}$.