

TD 5: MARTINGALES

Modèles Aléatoires Discrets M1- 2022-2023

1. Soit X_n et Y_n deux martingales de carré intégrable définies sur un espace de probabilité filtré $(\Omega, \mathcal{F}, \mathcal{F}_n, \mathbb{P})$.

(a) Montrer que pour tout $m \leq n$, on a $\mathbb{E}[X_m Y_n | \mathcal{F}_m] = X_m Y_m$ p.s., et donc en particulier que $\mathbb{E}[X_m X_n | \mathcal{F}_m] = X_m X_m$ p.s.

Solution: On sait que X_m est \mathcal{F}_m -mesurable donc

$$\mathbb{E}[X_m Y_n | \mathcal{F}_m] = X_m \mathbb{E}[Y_n | \mathcal{F}_m] \text{ p.s.}$$

De plus Y est une martingale et $m \leq n$ donc

$$\mathbb{E}[Y_n | \mathcal{F}_m] = Y_m \text{ p.s.}$$

On en conclut que $\mathbb{E}[X_m Y_n | \mathcal{F}_m] = X_m Y_m$ p.s.

(b) Montrer que pour tout $m < n \leq p < q$, on a $\text{Cov}(X_n - X_m, Y_q - Y_p) = 0$.

Solution: On a :

$$\text{Cov}(X_n - X_m, Y_q - Y_p) = \mathbb{E}((X_n - X_m)(Y_q - Y_p)) - \mathbb{E}(X_n - X_m)\mathbb{E}(Y_q - Y_p).$$

On a

$$\mathbb{E}(X_n - X_m) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(X_n - X_m | \mathcal{F}_m)) = \mathbb{E}(X_m - X_m) = 0.$$

De même $\mathbb{E}(Y_q - Y_p) = 0$. On a donc :

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X_n - X_m, Y_q - Y_p) &= \mathbb{E}((X_n - X_m)(Y_q - Y_p)) \\ &= \mathbb{E}(\mathbb{E}((X_n - X_m)(Y_q - Y_p) | \mathcal{F}_p)) \\ &= \mathbb{E}((X_n - X_m)\mathbb{E}((Y_q - Y_p) | \mathcal{F}_p)) \text{ car } (X_n - X_m) \text{ est } \mathcal{F}_m\text{-mesurable} \\ &= \end{aligned}$$

(c) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $\mathbb{E}[(X_n - X_0)^2] = \sum_{k=1}^n \mathbb{E}[(X_k - X_{k-1})^2]$.

Solution: On va raisonner par récurrence. Pour $n \in \{0, 1\}$, $(X_n - X_0)^2 = \sum_{k=1}^n (X_k - X_{k-1})^2$ et donc $\mathbb{E}[(X_n - X_0)^2] = \sum_{k=1}^n \mathbb{E}[(X_k - X_{k-1})^2]$.

On suppose l'égalité vraie au rang n . On a :

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}[(X_{n+1} - X_0)^2] &= \mathbb{E}[(X_{n+1} - X_n) + (X_n - X_0)]^2 \\
 &= \mathbb{E}[(X_{n+1} - X_n)^2 + (X_n - X_0)^2 + 2(X_{n+1} - X_n)(X_n - X_0)] \\
 &= \mathbb{E}[(X_{n+1} - X_n)^2 + (X_n - X_0)^2] \text{ par l'exercice précédent.} \\
 &= \mathbb{E}\left[(X_{n+1} - X_n)^2 + \sum_{k=1}^n (X_k - X_{k-1})^2\right] \\
 &= \sum_{k=1}^{n+1} \mathbb{E}[(X_k - X_{k-1})^2].
 \end{aligned}$$

2. On considère l'espace de probabilité filtré $(\Omega, \mathcal{F}, \mathcal{F}_n, \mathbb{P})$ où $\Omega = \mathbb{N}^*$, $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\mathbb{N}^*)$, $\mathbb{P}(\{n\}) = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$, $\mathcal{F}_n = \sigma(\{1\}, \dots, \{n\}, [n+1, +\infty[)$. On considère la suite de variables aléatoires réelles $X_n = (n+1)\mathbb{I}_{[n+1, +\infty[}$.

- (a) • Montrer que pour la filtration \mathcal{F}_n , X_n est une martingale positive.
 • Vérifier que $X_n \rightarrow 0$ p.s.
 • X_n converge-t-elle dans \mathcal{L}^1 ?

Solution: Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $X_n \in \{0, n+1\}$ donc la variable X_n est positive. Pour tout $i \in [[1; n]$,

$$\mathbb{E}(X_{n+1} | \{i\}) = 0.$$

On a également

$$\mathbb{E}(X_{n+1} | [n+1, +\infty[) = \frac{\left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}\right) \times 0 + \frac{1}{n+2} \times (n+2)}{\frac{1}{n+1}} = n+1.$$

On a bien $\mathbb{E}(X_{n+1} | \mathcal{F}_n) = X_n$ p.s.

Pour tout $i \in \mathbb{N}$, pour tout $n \geq i$, $X_n(i) = 0$ donc $X_n \rightarrow 0$ p.s.

On a $\mathbb{E}(|X_n - 0|) = \mathbb{E}(X_n) = 1$ donc on n'a pas convergence dans \mathcal{L}^1 .

- (b) Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, quelle est la valeur de $\sup_{n \in \mathbb{N}} X_n(k)$? En déduire $\mathbb{E}[\sup_{n \in \mathbb{N}} X_n]$.

Solution: On a que le maximum est atteint pour $n = k-1$ et on a alors $X_{k-1}(k) = k$ donc $\sup_{n \in \mathbb{N}} X_n(k) = k$. On en déduit que :

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}[\sup_{n \in \mathbb{N}} X_n]^* &= \sum_{k \geq 1} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) k \\
 &= \sum_{k \geq 1} \frac{1}{k(k+1)} k \\
 &= \sum_{k \geq 1} \frac{1}{(k+1)} \\
 &= \infty.
 \end{aligned}$$

3. Soit (Y_n) une suite de variables aléatoires réelles, positives, indépendantes, définies sur un espace de probabilité $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ et de même espérance 1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $\mathcal{F}_n = \sigma(Y_0, \dots, Y_n)$ et $X_n = Y_0 \dots Y_n$.

(a) Montrer que X_n est une \mathcal{F}_n -martingale et que $\sqrt{X_n}$ est une \mathcal{F}_n -surmartingale.

Solution:

(b) Montrer que le produit infini $\prod_{k=0}^{+\infty} \mathbb{E}[\sqrt{Y_k}]$ converge dans \mathbb{R}_+ , on note l sa limite.

Solution:

(c) On suppose que $l = 0$. Montrer que $\sqrt{X_n} \rightarrow 0$ p.s. La martingale (X_n) est-elle régulière ?

Solution:

(d) On suppose que $l > 0$. Montrer que $(\sqrt{X_n})$ est une suite de Cauchy dans L^2 . En déduire que (X_n) est régulière.

Solution:

(e) Application : Soit P et Q deux probabilités distinctes sur un ensemble dénombrable E et (Z_n) une suite de variables aléatoires indépendantes à valeurs dans E de même loi Q .

On suppose que pour tout $x \in E$, on a $Q(x) > 0$.

On pose $X_n = \frac{P(Z_0)}{Q(Z_0)} \dots \frac{P(Z_n)}{Q(Z_n)}$.

Déduire de ce qui précède que $X_n \rightarrow 0$ p.s.

Solution:

4. On considère une variable aléatoire N à valeurs dans \mathbb{N} , et une suite de variables aléatoires indépendantes et de même loi $(X_k)_{k \geq 1}$, indépendante de N .

On pose

$$Y = \sum_{k=1}^N X_k.$$

(a) Déterminer $\mathbb{E}[Y|N]$, puis $\mathbb{E}[Y]$.

Solution: On a:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[Y|N] &= \mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^N C_i | N\right] \\ &= \sum_{i=1}^N \mathbb{E}[C_i | N] \\ &= \sum_{i=1}^N \mathbb{E}(C_1) = N\mathbb{E}(C_1), \end{aligned}$$

où dans l'avant dernière égalité on utilise le fait que les C_i sont indépendantes de N . On obtient donc que

$$\mathbb{E}(Y) = \mathbb{E}(\mathbb{E}[Y|N]) = \mathbb{E}(N)\mathbb{E}(C_1).$$

(b) Déterminer $\text{Var}(Y|N)$, puis $\text{Var}(Y)$.

Solution: Rappelons que

$$\text{Var}(Y|N) = \mathbb{E}[(Y - \mathbb{E}[Y|N])^2|N],$$

et que

$$\text{Var} Y = \mathbb{E}(\text{Var}(Y|N)) + \text{Var}(\mathbb{E}[Y|N]).$$

On obtient

$$\begin{aligned} \text{Var}(Y|N) &= \mathbb{E}[Y^2|N] - \mathbb{E}[Y|N]^2 \\ &= \mathbb{E}[Y^2|N] - \mathbb{E}[Y|N]^2 \\ &= \dots = N \text{Var}(C_1). \end{aligned}$$

$$\text{Puis } \text{Var}(Y) = \dots = \mathbb{E}(N) \text{Var}(C_1) + \mathbb{E}(C_1)^2 \text{Var}(N)$$

(c) Montrer que $L_S = G_N \circ L_X$ où L_Z est la transformée de Laplace de la variable aléatoire Z et G_Z est sa fonction génératrice des probabilités.

Solution: On a pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(e^{\lambda Y}|N) &= \mathbb{E}\left(e^{\lambda \sum_{i=1}^n X_i} | N\right) \\ &= \mathbb{E}\left(\prod_{i=1}^n e^{\lambda X_i} | N\right) \\ &= \prod_{i=1}^n \mathbb{E}(e^{\lambda X_i} | N) \\ &= \mathbb{E}(e^{\lambda X_1})^N. \end{aligned}$$

On trouve donc :

$$\mathbb{E}(e^{\lambda Y}) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(e^{\lambda Y}|N)) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(e^{\lambda X_1})^N).$$

On a bien $L_S = G_N \circ L_X$.