

Chapitre 6

Formules de Cauchy, analyticité des fonctions holomorphes

6.1 Théorème de Goursat

Exercice 6.1.1 Soit Ω un ouvert étoilé et f une fonction holomorphe sur Ω . On suppose que $f(z) \neq 0$ pour tout $z \in \Omega$. Montrer que, pour tout $n \geq 2$, il existe une détermination holomorphe sur Ω de la racine n -ième de f .

Exercice 6.1.2 Soit $U = \mathbb{C} \setminus \{iy : y \in \mathbb{R}, |y| \geq 1\}$.

(i) Montrer qu'il existe une unique fonction f holomorphe sur U vérifiant

$$\forall z \in U \quad f'(z) = \frac{1}{1+z^2} \quad \text{et} \quad f(0) = 0.$$

(ii) Justifier que f est analytique en 0 et donner son développement en série de Taylor.

6.2 Formules de Cauchy

Exercice 6.2.1 Calculer pour $a \in \mathbb{C}^*$ et $R > 0$, $R \neq |a|$, l'intégrale

$$I = \int_{\gamma_R} \frac{e^{z^2}}{z^3 - a^3} dz,$$

où γ_R est le cercle de centre 0 et de rayon R .

Exercice 6.2.2 Soit f une fonction entière telle que, pour tout $z \in \mathbb{C}$, on ait :

$$|f(z)| \leq \sqrt{|z|}.$$

Montrer que f est constante.

Exercice 6.2.3 Soit f une fonction entière telle que $|f(z)| \rightarrow +\infty$ quand $|z| \rightarrow +\infty$.

1. Montrer que l'ensemble des zéros de f est fini.
2. Montrer que f est un polynôme.

Exercice 6.2.4 Soit U un ouvert de \mathbb{C} contenant le disque unité fermé $\bar{D} = D(0, 1]$. On note γ le cercle unité parcouru une fois dans le sens positif.

- a) Montrer qu'il existe $r > 1$ tel que $\text{Supp } \gamma \subset D(0, r] \subset U$.
- b) Soit f holomorphe sur U .

(i) En calculant de deux manières différentes l'intégrale curviligne suivante

$$I := \int_{\gamma} \left(2 + z + \frac{1}{z}\right) \frac{f(z)}{z} dz,$$

donner la valeur de $\int_0^{2\pi} f(e^{it}) \cos^2\left(\frac{t}{2}\right) dt$.

(ii) On fixe $a \in \mathbb{C}^*$, $|a| \neq 1$. Calculer

$$I(a) = \frac{1}{2\pi} \int_{\gamma} \frac{\overline{f(z)}}{z - a} dz.$$

Exercice 6.2.5 Soient $R > 0$, f une fonction holomorphe sur $D(0, R[$ et continue sur $D(0, R]$. On note γ_R le cercle de centre 0 et de rayon R parcouru une fois dans le sens positif. Montrer que, pour tout $z \in D(0, R[$, on a

$$f(z) = \frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma_R} \frac{f(u)}{u - z} du.$$

Exercice 6.2.6 Soit $R \geq 1$ et $f : D(0, R[\rightarrow \mathbb{C}$ une fonction holomorphe sur $D(0, R[$. On suppose que, pour tout $z \in D(0, 1[$, on a

$$|f(z)| \leq \frac{1}{1 - |z|}.$$

Montrer que $\forall n \geq 0$:

$$\left| \frac{f^{(n)}(0)}{n!} \right| \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n (n + 1).$$

6.3 Analyticité des fonctions holomorphes

Exercice 6.3.1 Soit $f : \mathbb{C} \setminus \{2ik\pi : k \in \mathbb{Z}\} \rightarrow \mathbb{C}$ définie par

$$f(z) = \begin{cases} \frac{z}{e^z - 1} & \text{si } z \neq 0 \\ 1 & \text{si } z = 0. \end{cases}$$

a) Montrer que f est analytique en 0. Soit $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ la série de Taylor de f à l'origine. Déterminer le rayon de convergence R de cette série entière.

b) Montrer qu'il existe une constante $M > 0$ telle que, pour tout $n \geq 0$, on ait

$$|a_n| \leq \frac{M}{2^n}.$$

Exercice 6.3.2 On fixe $\omega \in \mathbb{C}^*$ et on considère $g : z \mapsto g(z) = \frac{1}{1 - 2\omega z + z^2}$.

a) Montrer qu'il existe un voisinage V de 0 et une fonction f holomorphe sur V telle que

$$f(z)^2 = g(z), \quad \forall z \in V \quad \text{et} \quad f(0) = 1.$$

b) Montrer qu'il existe un disque ouvert D centré en 0 et $(P_n)_{n \geq 0}$ une suite de polynômes de degré n telle que

$$\forall z \in D, \quad f(z) = \sum_{n \geq 0} P_n(\omega) z^n.$$