

# Feuille 6

## Compléments

Exo 1

Matrices à diagonale dominante.

$A \in M_n(\mathbb{C})$  est à diag. dom si

$$|A_{ii}| > \sum_{j \neq i} |A_{ij}| \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

1) Montrer que  $A$  inversible

1) D'après l'exo 4 fiche 5 (Gerschgorin), toute valeur propre est dans l'un des disques

$$D_i = \left\{ z \in \mathbb{C}, |z - A_{ii}| \leq \sum_{j \neq i} |A_{ij}| \right\}$$

Par l'absurde, supposons que 0 est valeur propre de  $A$ .

Abs,  $\exists i \in \{1, \dots, n\}$ ,  $|A_{ii} - 0| \leq \sum_{j \neq i} |A_{ij}|$   
par Gerschgorin

ce qui contredit l'hypothèse de diagonale dominante.

donc 0 n'est pas valeur propre

donc  $A$  inversible.

2) Soit  $J$  la matrice de Jacobi de  $A$ . Montrer  $\|J\|_{\infty} < 1$  et en déduire que la méthode converge.

2) On écrit  $A = D - E - F$

$\uparrow$  diagonale       $\uparrow$  triangulaire inf stricte       $\uparrow$  triangulaire sup. strict.

$$J = D^{-1}(E + F) \quad (D \text{ inversible car ses éléments sont } \neq 0)$$

$$\|J\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |J_{ij}| \quad (*)$$

$\uparrow$   
 exo 4  
 fiche 2

Soient  $A_{ij}$  les éléments de matrice de  $A$ .

$$D = \begin{pmatrix} A_{11} & & (0) \\ & \ddots & \\ (0) & & A_{nn} \end{pmatrix}, \quad E = - \begin{pmatrix} 0 & & (0) \\ A_{21} & & \\ \vdots & \ddots & \\ A_{m1} & & A_{n-1} \end{pmatrix}$$

$$F = - \begin{pmatrix} 0 & A_{12} & \dots & A_{1n} \\ & \ddots & & \\ & & A_{2m} & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$$

$$(D^{-1})_{ii} = \frac{1}{A_{ii}}, \quad E + F = - \begin{pmatrix} 0 & A_{12} & \dots & \\ \vdots & \ddots & & \\ A_{m1} & & A_{n-1} & 0 \end{pmatrix}$$

$$J_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{si } i = j \\ -\frac{A_{ij}}{A_{ii}} & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

D'après (\*)

$$\|J\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |J_{ij}|$$

$$= \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{|A_{ij}|}{|A_{ii}|} \quad (\text{car } J_{ii} = 0)$$

$$= \max_{1 \leq i \leq n} \frac{1}{|A_{ii}|} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |A_{ij}|$$

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}, \frac{1}{|A_{ii}|} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |A_{ij}| < 1 \quad (\text{car diag- dom.})$$

$$\text{donc } \|J\|_{\infty} < 1.$$

• D'après le cours, pour toute norme subordonnée,  $\rho(J) \leq \|J\|$ .

donc  $\rho(J) \leq \|J\|_{\infty} < 1$ , donc  $\rho(J) < 1$  donc la méthode converge

• On peut aussi conclure directement de  $\|J\|_{\infty} < 1$  (même thm du cours)

3) Montrer que si  $\lambda$  est valeur propre de la matrice de Gauss-Seidel  $G$ , alors

$\lambda$  est valeur propre de  $M = \begin{pmatrix} \lambda A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} \\ \lambda A_{21} & \lambda A_{22} & & A_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ \lambda A_{m1} & \dots & \dots & \lambda A_{mm} \end{pmatrix}$

En déduire  $|\lambda| < 1$   
et G-S converge.

$$3) A = D - E - F$$

$$G = (D - E)^{-1} F$$

•  $D - E$  est bien inversible car  $D - E$  est aussi à diag. dom.

En effet  $|A_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |A_{ij}| \geq \sum_{j < i} |A_{ij}|$

donc  $|(D - E)_{ii}| > \sum_{j < i} |A_{ij}| = \sum_{j \neq i} |(D - E)_{ij}|$

donc  $G$  est bien définie.

• Autre argument  $\det(D - E) = \det D$  car  $D - E$  triangulaire inférieure.

et  $D$  inversible, donc  $\det D = \det(D - E) \neq 0$ .

Soit  $\lambda$  une valeur propre de  $G$  et  $x$  le vecteur propre associé.

$$Gx = \lambda x$$

donc  $(D - E)^{-1} Fx = \lambda x$

On multiplie par  $D - E$  des deux côtés.

$$Fx = \lambda (D - E)x$$

$$\Rightarrow (\lambda D - \lambda E - F)x = 0$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} \lambda A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} \\ \lambda A_{21} & \dots & \dots & \dots \\ \vdots & \dots & \dots & \dots \\ \lambda A_{m1} & \dots & \dots & \lambda A_{mm} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = 0$$

("plus de  $\lambda$  par  $j > i$ ")

$$\text{donc } Mx = 0$$

Au final, si  $\lambda$  est valeur propre de  $G$ , alors  $0$  est valeur propre de  $M$ .

• Par l'absurde supposons  $|\lambda| \geq 1$ .

\* Par commodité, faisons d'abord le cas  $\lambda = 1$ , plus simple.

Alors  $M = A$  est à diagonale dominante, donc inversible (question 1)

contradiction avec  $0$  valeur propre de  $M$ .

\* Montrons maintenant que  $M$  est à diagonale dominante  $\forall |\lambda| \geq 1$ .

Partons de  $A$ .  $A$  est à diag. dom.

$$|A_{ii}| > \sum_{j \neq i} |A_{ij}|$$

$$|A_{ii}| > \sum_{j < i} |A_{ij}| + \sum_{j > i} |A_{ij}|$$

$$|\lambda| |A_{ii}| > \sum_{j < i} |\lambda| |A_{ij}| + \sum_{j > i} |\lambda| |A_{ij}|$$

$$\text{(car } |\lambda| \geq 1) \left\{ \sum_{j < i} |\lambda| |A_{ij}| + \sum_{j > i} |A_{ij}| \right.$$

$$\left. \sum_{j \neq i} |M_{ij}| \right\}$$

$$\text{donc } |\lambda| |A_{ii}| = |M_{ii}| > \sum_{j \neq i} |M_{ij}|$$

donc  $M$  est à diag dom

donc  $M$  inversible

Contradiction avec 0 valeur propre de  $M$ .

donc  $|\lambda| < 1$  et donc G-S converge.

**Exo 2** Méthode de la puissance.

$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  diagonalisable,  $(u_i)$  base de vecteurs propres,

$$A u_i = \lambda_i u_i$$

$$\underbrace{\lambda_1 = \dots = \lambda_p}_{\text{la plus grande valeur propre en module a multiplicité } p} \text{ et } |\lambda_i| < |\lambda_1| \text{ par } i \in \{p+1, \dots, n\}$$

la plus grande valeur propre en module a multiplicité  $p$ .

$$1) x_0 = \sum_{i=1}^n \alpha_i u_i \quad \text{Que vaut } \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{A^k x_0}{\lambda_1^k}$$

$$1) A^k x_0 = \sum_{i=1}^n \alpha_i A^k u_i$$

$$A^k x_0 = \sum_{i=1}^n \alpha_i \lambda_i^k u_i \quad (\text{par récurrence immédiate})$$

$$\frac{A^k x_0}{\lambda_1^k} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \left( \frac{\lambda_i}{\lambda_1} \right)^k u_i$$

• Si  $i \in \{1, \dots, p\}$   $\frac{d_i}{\lambda_1} = 1$ .

• Si  $i \in \{p+1, \dots, n\}$ ,  $\left| \frac{d_i}{\lambda_1} \right| < 1$  par hypothèse

donc  $\lim_{k \rightarrow \infty} \left( \frac{d_i}{\lambda_1} \right)^k = 0$  (suite géométrique de raison  $< 1$  en module)

Donc  $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{A^k x_0}{\lambda_1^k} = \sum_{i=1}^p \alpha_i u_i \in \text{Vect}(u_1, \dots, u_p)$   
 //  
 sous-espace propre associé à la valeur propre  $\lambda_1$ .

On note  $U = \left\{ x_0, \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{A^k x_0}{\lambda_1^k} \neq 0 \right\}$

Montrer  $U$  ouvert dense de  $\mathbb{C}^n$ .

$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{A^k x_0}{\lambda_1^k} = \sum_{i=1}^p \alpha_i u_i$ . Donc cette limite est

non nulle si  $\exists i \in \{1, \dots, p\}, \alpha_i \neq 0$ .

$U = \left\{ (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{C}^n, \exists i \in \{1, \dots, p\}, \alpha_i \neq 0 \right\}$

Montrons  $U$  ouvert: Soit  $x \in U, x = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$

Soit  $i_0 \in \{1, \dots, p\}, \alpha_{i_0} \neq 0$ .

On vérifie facilement que la boule de centre  $x$  et de rayon  $\frac{|\alpha_{i_0}|}{2}$  appartient à  $U$ .

Donc le voisinage de  $x$  appartient à  $\bar{U}$ , et  $U$  est ouvert

Densité de  $U$  dans  $\mathbb{C}^n$ : Soit  $x \in \mathbb{C}^n, x \notin U$ .

Abs  $x = (0, 0, \dots, 0, \alpha_{p+1}, \dots, \alpha_n)$  et  $x = \lim_{k \rightarrow \infty} y_k$

avec  $y_k = \left( \frac{1}{k}, 0, \dots, 0, \alpha_{p+1}, \dots, \alpha_n \right)$  et  $y_k \in U$ .

$$2) \quad d(y, z) = \inf_{0 \leq \theta \leq 2\pi} \|y - e^{i\theta} z\|_2, \quad \|y\|_2 = \|z\|_2 = 1$$

Soit  $x_0 \in U$  et  $(x_k)$  la suite

$$x_k = \frac{A^k x_0}{\|A^k x_0\|_2}$$

Montrer  $\exists x_{\infty}$  unitaire t.g.  $\lim_{k \rightarrow \infty} d(x_k, x_{\infty}) = 0$

$$2) \quad x_k = \frac{A^k x_0}{\|A^k x_0\|_2}$$

$$x_k = \frac{\frac{A^k x_0}{\lambda_1^k}}{\left\| \frac{A^k x_0}{\lambda_1^k} \right\|_2} \frac{\lambda_1^k}{|\lambda_1|^k}$$

On pose  $\tilde{x}_k = \frac{\frac{A^k x_0}{\lambda_1^k}}{\left\| \frac{A^k x_0}{\lambda_1^k} \right\|_2}$

D'après la question précédente  $\tilde{x}_k$  converge lorsque  $k \rightarrow \infty$ .

Posons  $x_{\infty} = \lim_{k \rightarrow \infty} \tilde{x}_k$

Alors  $d(x_k, x_{\infty}) = d(\tilde{x}_k, x_{\infty})$

car  $\frac{\lambda_1^k}{|\lambda_1|^k}$  a  
module 1.



On montre facilement que  $d$  est continue

$$\text{et } \lim_{k \rightarrow \infty} d(x_k, x_\infty) = 0.$$

Aussi,  $\tilde{x}_k$  est trivialement unitaire, donc  $x_\infty$  aussi

Montrer que  $x_\infty$  est vecteur propre de valeur propre  $\lambda_1$ .

En utilisant la question 1, il vient

$$x_\infty = \frac{\sum_{i=1}^p \alpha_i u_i}{\left\| \sum_{i=1}^p \alpha_i u_i \right\|_2}$$

$$\text{et } Ax_\infty = \lambda_1 x_\infty \quad (\text{car } Au_i = \lambda_i u_i \quad \forall i \in \{1, \dots, p\})$$

$$\text{Montrer que } \lambda_1 = \lim_{k \rightarrow \infty} \langle Ax_k | x_k \rangle$$

$$\begin{aligned} \langle Ax_k | x_k \rangle &= \left( \frac{\lambda_1}{|\lambda_1|} \right)^k \overline{\left( \frac{\lambda_i}{|\lambda_1|} \right)^k} \langle A\tilde{x}_k | \tilde{x}_k \rangle \\ &= \langle A\tilde{x}_k | \tilde{x}_k \rangle \end{aligned}$$

Par continuité des produits scalaire et du produit matrice vecteur,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \langle Ax_k | x_k \rangle = \langle Ax_\infty | x_\infty \rangle$$

$$= \lambda_1 \langle x_\infty | x_\infty \rangle \quad (\text{on prend le produit scalaire linéaire à gauche})$$

$$= \lambda_1$$

3) Comment adapter l'algorithme précédent

pour trouver la valeur propre de plus petit module ?

3) on suppose  $A$  inversible

Alors  $A^{-1}$  a pour valeurs propres  $(1/\lambda_1, \dots, 1/\lambda_n)$

donc la plus grande valeur propre de  $A^{-1}$  est  $1/\lambda_{\min}$ , or  $\lambda_{\min}$  est la plus petite valeur propre de  $A$ .

Ainsi, il suffit d'appliquer la méthode de la puissance  
à  $A^{-1}$ .