



Pour cocher, il suffit de cliquer !

Nom et prénom :

Fondamentaux des mathématiques II printemps 2019

chapitres V applications linéaires, VI formules de Taylor, VII représentation matricielle des applications linéaires, VIII intégrale de Riemann
exercices d'entraînement

Règlement – L'épreuve dure ??? minutes. Les calculatrices sont interdites. Les téléphones portables doivent être éteints.

Cochez une seule réponse par question.

Sur les sommes de Riemann

Question 1 Que vaut $\frac{1}{n^6} \sum_{k=1}^n k^5$?

$\frac{1}{5}$

1

Cette limite n'existe pas !

$\frac{1}{6}$

Question 2 Que vaut $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k+3n}$?

$\ln(4/3)$

$\frac{1}{3} - \frac{1}{4}$

$\ln 4$

$\ln 3$

Question 3 Que vaut $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k+2n}$?

$\ln\left(\frac{3}{2}\right)$

$\ln 2$

$\frac{1}{2} - \frac{1}{3}$

$\ln 3$

Question 4 Que vaut $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\cos\left(\frac{\pi k}{n}\right)}{n}$?

Cette limite n'existe pas !

$\frac{1}{\pi}$

0

$\frac{2}{\pi}$

Question 5

Que vaut $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n \sqrt{n+k}$?

$\frac{2}{3}$

$\frac{4\sqrt{2}-2}{3}$

Cette limite n'existe pas !

$2^{\frac{3}{2}} - 1$

Question 6 Que vaut $\lim_{n \rightarrow \infty} n \sum_{k=1}^n \frac{1}{(n+k)^2}$?

$-\frac{1}{2}$

1

Cette limite n'existe pas !

$\frac{1}{2}$



Question 7 Que vaut $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sin(\frac{\pi k}{n})}{n}$?

- $\frac{2}{\pi}$ $\frac{1}{\pi}$ 0 Cette limite n'existe pas !
-

Question 8

Que vaut $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n+k}}$?

- $2\sqrt{2} - 2$ 1 $+\infty$ $\sqrt{2} - 1$
-

Question 9 Que vaut $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{2k}{k^2+n^2}$?

- $\ln 2$ $\ln 4$ $\ln 3$ Cette limite n'existe pas !
-

Question 10 Que vaut $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k+n}$?

- $\ln 3$ Cette limite n'existe pas ! $\frac{\ln 3}{2}$ $\ln 2$
-
-

Sur les intégrales

Question 11 Que vaut $\int_1^2 \ln x dx$?

- 1 $2 \ln 2$ $2 \ln 2 - 1$ $1/2$
-

Question 12 Que vaut $\int_0^1 x \sin(2x) dx$?

- $(\cos 2)/2 - (\sin 2)/4$ $(\sin 2)/4$ $(\sin 2)/4 - (\cos 2)/2$ 0
-

Question 13 Que vaut $\int_0^1 \arctan x dx$?

- $\frac{\pi}{4} - \frac{\ln 2}{2}$ $\frac{\pi}{4} - \ln 2$ $-\ln 2$ $\frac{\pi}{4}$
-

Question 14 Que vaut $\int_0^1 x e^{3x} dx$?

- $\frac{e^3}{3}$ e^3 $\frac{2}{9} e^3$ $\frac{2}{9} e^3 + \frac{1}{9}$
-

Question 15 Que vaut $\int_0^1 x \cos(\pi x) dx$?

- $1/\pi$ $-1/\pi$ $-2/\pi^2$ $2/\pi^2$
-

Question 16 Que vaut $\int_1^2 x^2 \ln x dx$?

- $-7/9$ $7/9$ $\frac{8 \ln 2}{3} - \frac{7}{9}$ $\frac{8 \ln 2}{3}$
-



Question 17 Que vaut $\int_0^1 x \cos(3x) dx$?

$$\frac{\sin 3}{3} + \frac{\cos 3}{9}$$

$$\frac{\sin 3}{3} + \frac{\cos 3}{9} - \frac{1}{9}$$

$$\frac{\sin 3}{3}$$

$$\frac{\cos 3}{9} - \frac{1}{9}$$

Question 18 Que vaut $\int_1^2 x^3 \ln x dx$?

$$15/16$$

$$4 \ln 2$$

$$4 \ln 2 - 15/16$$

$$-15/16$$

Question 19 Que vaut $\int_0^1 x \sin(\pi x) dx$?

$$-1/\pi$$

$$0$$

$$1/\pi^2$$

$$1/\pi$$

Question 20 Que vaut $\int_0^1 x e^{-x} dx$?

$$-e^{-1}$$

$$1 - e^{-1}$$

$$2e^{-1} - 1$$

$$1 - 2e^{-1}$$

Sur la représentation matricielle des applications linéaires

Question 21 Soit $\mathbb{R}_3[X]$ l'espace vectoriel des polynômes réels de degré ≤ 3 . Soit f l'application linéaire :

$$f : \mathbb{R}_3[X] \rightarrow \mathbb{R}_3[X], P(X) \mapsto P(X+1).$$

Quelle est la matrice de f dans la base $1, X, X^2, X^3$?

$$I_3 \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$I_4 \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Question 22 Soit $\mathbb{R}_2[X]$ l'espace vectoriel des polynômes réels de degré ≤ 2 . Soit f l'application linéaire :

$$f : \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}_2[X], P(X) \mapsto P(0) + P(1)X + P(2)X^2.$$

Quelle est la matrice de f dans la base $1, X, X(X-1)$?

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 4 \end{pmatrix}$$

Question 23 Soit $\mathbb{R}_2[X]$ l'espace vectoriel des polynômes réels de degré ≤ 2 . Soit f l'application linéaire :

$$f : \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}_2[X], P(X) \mapsto XP' \left(\frac{1}{X} \right).$$


Quelle est la matrice de f dans la base $1, X, \frac{X^2}{2}$?

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$I_3$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



Question 24 Soit $\mathbb{R}_3[X]$ l'espace vectoriel des polynômes réels de degré ≤ 2 . Soit f l'application linéaire :

$$f : \mathbb{R}_3[X] \rightarrow \mathbb{R}_3[X], P(X) \mapsto P(0) + P(1)X + P(2)X^2.$$

Quelle est la matrice de f dans la base $1, X - 1, (X - 1)^2$?

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Question 25 Soit $\mathbb{R}_2[X]$ l'espace vectoriel des polynômes réels de degré ≤ 2 . Soit f l'application linéaire :

$$f : \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}_2[X], P(X) \mapsto X \frac{P(X) - P(1)}{X - 1}.$$

Quelle est la matrice de f dans la base $1, X, X^2$?

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Question 26 Soit $\mathbb{R}_2[X]$ l'espace vectoriel des polynômes réels de degré ≤ 2 . Soit f l'application linéaire :

$$f : \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}_2[X], P(X) \mapsto X^2 P''(X) - X P'(X).$$

Quelle est la matrice de f dans la base $1, X, X^2$?

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Question 27 Soit $\mathbb{R}_4[X]$ l'espace vectoriel des polynômes réels de degré ≤ 4 . Soit f l'application linéaire :

$$f : \mathbb{R}_4[X] \rightarrow \mathbb{R}_4[X], P(X) \mapsto P'(X).$$

Quelle est la matrice de f dans la base $1, X, (X - 1)^2, (X - 1)^3, (X - 1)^4$?

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Question 28 Soit $\mathbb{R}_3[X]$ l'espace vectoriel des polynômes réels de degré ≤ 3 . Soit f l'application linéaire :

$$f : \mathbb{R}_3[X] \rightarrow \mathbb{R}_3[X], P(X) \mapsto \frac{P(X) - P(1)}{X - 1}.$$

Quelle est la matrice de f dans la base $1, X, X^2, X^3$?

$$I_4 \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



Question 29 Soit $\mathbb{R}_2[X]$ l'espace vectoriel des polynômes réels de degré ≤ 2 . Soit f l'application linéaire :

$$f : \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}_2[X], P(X) \mapsto X^2 P\left(\frac{1}{X}\right).$$

Quelle est la matrice de f dans la base $1, X - 1, (X - 1)^2$?

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Question 30 Soit $\mathbb{R}_4[X]$ l'espace vectoriel des polynômes réels de degré ≤ 4 . Soit f l'application linéaire :

$$f : \mathbb{R}_4[X] \rightarrow \mathbb{R}_4[X], P(X) \mapsto P'(X).$$

Quelle est la matrice de f dans la base $1, X, \frac{X^2}{2}, \frac{X^3}{6}, \frac{X^4}{24}$?

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Sur les applications linéaires

Question 31 Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, (x, y, z) \mapsto (2x + 6y + 4z, 3x + 9y + 6z, 5x + 15y + 10z)$.

Alors

$$\begin{array}{lll} \dim \ker f = 2. & f \text{ est un isomorphisme.} & \ker f = \text{Im} f. \\ f \text{ est surjective mais non injective.} & & \text{rg} f = 2. \end{array}$$

Question 32 Soit $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3, (x, y, z, t) \mapsto (x + y + 2z + 3t, y + z + t, 2x + y + 5z + 7t)$.

Alors

$$\begin{array}{llll} f \text{ est surjective.} & \text{rg} f = 1. & f \text{ est un isomorphisme.} & f \text{ est injective.} \\ & & \dim \ker f = 2. & \end{array}$$

Question 33 Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4, (x, y, z) \mapsto (x + 2y + z, 3x + 4y + 3z, x + z, -2y)$.

Alors

$$\begin{array}{llll} f \text{ est un isomorphisme.} & \dim \ker f = 1. & f \text{ est surjective.} & \text{rg} f = 1. \\ & f \text{ est injective.} & & \end{array}$$

Question 34 Soit $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3, (x, y, z, t) \mapsto (3x + 9y - 3z + 6t, y + z + t, z - t)$.

Alors

$$\begin{array}{llll} f \text{ est injective.} & f \text{ est un isomorphisme.} & \dim \ker f = 2. & f \text{ est surjective.} \\ & & \text{rg} f = 1. & \end{array}$$

Question 35 Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4, (x, y, z) \mapsto (x + 2y + 3z, 4x + 5y + 6z, 7x + 8y + 9z, 7x + 8y)$.

Alors

$$\begin{array}{llll} f \text{ est injective.} & \dim \ker f = 1. & \text{rg} f = 1. & f \text{ est surjective.} \\ & f \text{ est un isomorphisme.} & & \end{array}$$



Question 43 En appliquant la formule de Taylor-Lagrange à la fonction :

$$f : x \mapsto \sqrt{1+x},$$

on peut démontrer que pour tout $-1 \leq x \leq 1$:

$$1+x \geq f(x). \quad 1 + \frac{x}{2} \geq f(x). \quad 1 + \frac{x}{2} \leq f(x). \quad 1+x \leq f(x).$$

Question 44 En appliquant la formule de Taylor-Lagrange à la fonction :

$$f : x \mapsto \arctan x,$$

on peut démontrer que pour tout $x \geq 0$:

$$1-x \leq f(x). \quad x \leq f(x). \quad 1+x \leq f(x). \quad x \geq f(x).$$

Question 45 En appliquant la formule de Taylor-Lagrange à la fonction :

$$f : x \mapsto \cos x,$$

on peut démontrer que pour tout $x \geq 0$:

$$1 - \frac{x^2}{2} \leq f(x). \quad x \leq f(x). \quad 1 - \frac{x^2}{2} \geq f(x). \quad x \geq f(x).$$

Question 46 En appliquant la formule de Taylor-Lagrange à la fonction :

$$f : x \mapsto e^x,$$

on peut démontrer que pour tout $x \geq 0$:

$$1+x+\frac{x^2}{2} \leq f(x). \quad 1+x+\frac{x^2}{2} \geq f(x). \quad 1+x+x^2 \geq f(x). \\ 1+x+x^2 \leq f(x).$$

Question 47 En appliquant la formule de Taylor-Lagrange à la fonction :

$$f : x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1+x}},$$

on peut démontrer que pour tout $x \geq 0$:

$$1+2x \leq f(x). \quad 1 - \frac{x}{2} + \frac{3}{8}x^2 \geq f(x). \quad x + \frac{x}{2} \geq f(x). \quad 1 - \frac{x}{2} + \frac{3}{8}x^2 \leq f(x).$$

Question 48 En appliquant la formule de Taylor-Lagrange à la fonction :

$$f : x \mapsto \tan x,$$

on peut démontrer que pour tout $0 < x < \frac{\pi}{2}$:


$$1+x+\frac{x^2}{2} \geq f(x). \quad 1 - \frac{x^2}{2} \leq f(x). \quad x \geq f(x). \quad x \leq f(x).$$

Question 49 En appliquant la formule de Taylor-Lagrange à la fonction :

$$f : x \mapsto \frac{1}{1+x},$$

on peut démontrer que pour tout $x \geq 0$:

$$1 + \frac{x}{2} \leq f(x). \quad 1 - x + x^2 \geq f(x). \quad 1 - \frac{x}{2} \leq f(x). \quad 1 - x + x^2 \leq f(x).$$



Question 50 En appliquant la formule de Taylor-Lagrange à la fonction :

$$f : x \mapsto \frac{1}{1-x},$$

on peut démontrer que pour tout $-1 < x < 1$:

$$1 + 2x \leq f(x).$$

$$1 + x + x^2 \geq f(x).$$

$$1 + x + x^2 \leq f(x).$$

$$x + \frac{x}{2} \geq f(x).$$

Sur les formules de Taylor

Question 51 Soit $f(x) = -\frac{x+1}{2x+x^2}$ pour $x \in]-2, 0[$ et $n \in \mathbb{N}$. Alors,

$$\begin{array}{ll} f^{(2n)}(-1) = 0 \text{ et } f^{(2n+1)}(-1) = (2n+1)! & f(-1) = 0 \text{ et } f^{(n)}(-1) = n! \text{ si } n \geq 1 \\ f^n(1) = n! & f(-1) = 0 \text{ et } f^{(n)}(-1) = 1 \text{ si } n \geq 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} f^{(2n)}(1) = 0 \text{ et } f^{(2n+1)}(1) = 1 \\ f^{(2n)}(1) = 0 \text{ et } f^{(2n+1)}(1) = 1 \end{array}$$

Question 52 Soit $f(x) = \frac{x}{1-x^2}$ pour $x \in]-1, 1[$ et $n \in \mathbb{N}$. Alors,

$$\begin{array}{ll} f^{(2n)}(0) = 0 \text{ et } f^{(2n+1)}(0) = (2n+1)! & f(0) = 0 \text{ et } f^{(n)}(0) = 1 \text{ si } n \geq 1 \\ f(0) = 0 \text{ et } f^{(n)}(0) = n! \text{ si } n \geq 1 & f^{(n)}(0) = n! \end{array} \quad \begin{array}{l} f^{(2n)}(0) = 0 \text{ et } f^{(2n+1)}(0) = 1 \\ f^{(2n)}(0) = 0 \text{ et } f^{(2n+1)}(0) = 1 \end{array}$$

Question 53 Soit $f \in C^4(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telle que $f(0) = 1$, $f(1) = 0$, $f'(0) = f'(1) = 1$, $f''(0) = f''(1) = 2$, $f'''(0) = f'''(1) = 6$ et $|f^{(4)}(x)| \leq 24$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Toutes les assertions suivantes sont nécessairement fausses, sauf une. Laquelle ?

$$f(0, 1) = 0, 111$$

$$f(1, 1) = 0, 1109$$

$$f(1, 1) = 0, 126$$

$$f(0, 1) = 0, 126$$

$$f(1, 1) = 0, 1112$$

Question 54 Soit $f \in C^4(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telle que $f(1) = 0$, $f(0) = 1$, $f'(0) = f'(1) = 1$, $f''(0) = f''(1) = 2$, $f'''(0) = f'''(1) = 6$ et $|f^{(4)}(x)| \leq 24$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Toutes les assertions suivantes sont nécessairement fausses, sauf une. Laquelle ?

$$f(0, 1) = 0, 1112$$

$$f(1, 1) = 0, 111$$

$$f(0, 1) = 0, 1109$$

$$f(0, 1) = 0, 126$$

$$f(1, 1) = 0, 126$$

Question 55 Soit $f(x) = \frac{x-1}{2x-x^2}$ pour $x \in]0, 2[$ et $n \in \mathbb{N}$. Alors,

$$\begin{array}{ll} f^{(2n)}(1) = 0 \text{ et } f^{(2n+1)}(1) = 1 & f(1) = 0 \text{ et } f^{(n)}(1) = n! \text{ si } n \geq 1 \\ f(1) = 0 \text{ et } f^{(n)}(1) = 1 \text{ si } n \geq 1 & f^{(2n)}(1) = 0 \text{ et } f^{(2n+1)}(1) = (2n+1)! \end{array} \quad \begin{array}{l} f^{(n)}(1) = n! \\ f^{(n)}(1) = n! \end{array}$$