

Fiche de TD 1

Quelques bijections, relations d'équivalence et relations d'ordre

Exercice 1 Trouver une bijection $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$.

Exercice 2 a) Montrer que l'application

$$\mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{>0}, (m, n) \mapsto 2^m(2n + 1)$$

est une bijection.

b) Montrer que l'application

$$\mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, (m, n) \mapsto \frac{(m+n)(m+n+1)}{2} + m$$

est une bijection.

c) Si $F = \{a_0 < a_1 < \dots < a_k\}$ est une partie finie de \mathbb{N} , on pose $\phi(F) = 2^{a_0} + 2^{a_1} + \dots + 2^{a_k}$. Montrer que ϕ est une bijection entre l'ensemble des parties finies de \mathbb{N} et \mathbb{N} . Existe-t-il une bijection entre \mathbb{N} et l'ensemble des parties de \mathbb{N} ?

Exercice 3 a) On définit par récurrence $r_1 = 1$ et si $n > 0$, si $r_n = \frac{a}{b}$ avec a, b entiers > 0 premiers entre eux,

$$r_{2n} := \frac{a}{a+b}, r_{2n+1} = \frac{a+b}{a}.$$

Déterminer les 10 premiers termes de cette suite.

b) Montrer que $\mathbb{N}_{>0} \rightarrow \mathbb{Q}_{>0}, n \mapsto r_n$ est une bijection.

Indication. Voici la réciproque : on pose $g(1) = 1$ et

$$g(q) = \begin{cases} 2g\left(\frac{q}{1-q}\right) & \text{si } 0 < q < 1, \\ 2g\left(\frac{1}{q-1}\right) + 1 & \text{si } q > 1. \end{cases}$$

Exercice 4 a) Soient $x, y \in \mathbb{R}$. On note $x \sim y$ si $x - y \in \mathbb{Z}$. Montrer que la relation \sim est d'équivalence. On note \bar{x} la classe d'équivalence de x . Montrer que $\mathbb{R}/\mathbb{Z} \rightarrow S^1 \dagger, \bar{x} \mapsto e^{2i\pi x}$ est une bijection.

†. On note \mathbb{R}/\mathbb{Z} l'ensemble des classes d'équivalence des éléments de \mathbb{R} et S^1 les nombres complexes de module 1.

- b) Soit $n \in \mathbb{Z}$. Si $x, y \in \mathbb{Z}$, on note $x \sim y$ si $n|x - y$. Montrer que la relation \sim est d'équivalence et que l'on a une bijection :

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mu_n, \bar{x} \mapsto e^{\frac{2i\pi x}{n}} .$$

†

Exercice 5 Soient $(a, b), (c, d) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. On pose $(a, b) \sim (c, d)$ si $ad = bc$. Montrer que la relation \sim est d'équivalence pour l'ensemble $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

Exercice 6 Soit $(r_n) \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$. On dit que la suite (r_n) est de Cauchy si :

$$\forall A \in \mathbb{Z}_{>0}, \exists N \in \mathbb{N}, \forall m, n \geq N, |r_m - r_n| < \frac{1}{A} .$$

On note $\mathcal{C}(\mathbb{Q})$ l'ensemble des suites rationnelles de Cauchy.

Si $r = (r_n), s = (s_n)$ sont de Cauchy, on note $r \sim s$ si $\lim_n r_n - s_n = 0$. Montrer que c'est une relation d'équivalence !

Exercice 7 a) Si $k, l \in \mathbb{Z}$, posons $k < l$ si $k|l$. Montrer que $<$ est une relation d'ordre dans \mathbb{N} . Est-elle totale?

b) Mêmes questions avec $\{2^q : q \in \mathbb{N}\}$ à la place de \mathbb{N} .

†. On note $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ l'ensemble des classes d'équivalence des entiers et μ_n l'ensemble des racines n -ièmes de l'unité dans \mathbb{C} .